

Тестовые задания для проведения первого этапа первичной аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием по специальности **31.02.06 СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ**

**1. [T002038] ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, К ОБЩЕМУ ЧИСЛУ ОБСЛЕДОВАННЫХ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) распространенностью стоматологического заболевания
- Б) стоматологической заболеваемостью населения
- В) уровнем стоматологической помощи населению
- Г) интенсивностью стоматологического заболевания

**2. [T002039] РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫРАЖАЕТСЯ В ЕДИНИЦАХ**

- А) процентных
- Б) абсолютных
- В) относительных
- Г) условных

**3. [T002040] КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРИЗНАКОВ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА У ОДНОГО ИНДИВИДУУМА ИЛИ ГРУППЫ ОБСЛЕДОВАННЫХ, НАЗЫВАЕТСЯ:**

- А) интенсивностью стоматологического заболевания
- Б) распространенностью стоматологического заболевания
- В) стоматологической заболеваемостью населения
- Г) уровнем стоматологической помощи населению

**4. [T002041] НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) кариес зубов и заболевания пародонта
- Б) заболевания слизистой оболочки полости рта
- В) кариес корня и гиперчувствительность зубов
- Г) зубочелюстные аномалии и деформации

**5. [T002042] ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА ЗУБОВ ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- А) суммой кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложнений кариеса зубов у индивидуума
- Б) отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложнений кариеса зубов к возрасту пациента
- В) отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложнений кариеса зубов к количеству зубов пациента
- Г) средним показателем суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложнений кариеса зубов в группе индивидуумов

**6. [T002043] ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- А) суммой секстантов пародонта, имеющих признаки поражения
- Б) отношением количества пораженных секстантов к количеству здоровых секстантов
- В) отношением количества здоровых секстантов к количеству пораженных секстантов
- Г) отношением количества пораженных секстантов к общему количеству секстантов

**7. [T002044] КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ В ПОПУЛЯЦИИ (ВОЗ)**

- А) 5
- Б) 2
- В) 3
- Г) 4

**8. [T002045] УРОВНИ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА В ПОПУЛЯЦИИ (ВОЗ) ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП**

- А) 12 лет и 35-44 года
- Б) 15 и 18 лет
- В) 12 и 15 лет
- Г) 6 и 12 лет

**9. [T002046] СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ**

- А) эпидемиологического стоматологического обследования
- Б) диспансеризации населения
- В) плановой санации полости рта
- Г) профилактических осмотров населения

**10. [T002047] ВОЗ РЕКОМЕНДУЕТ ПРОВОДИТЬ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОДИН РАЗ В**

- А) 5 лет
- Б) 3 года
- В) 2 года
- Г) 1 год

**11. [T002048] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ВОЗ В ОДНОМ РАЙОНЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСМАТРИВАТЬ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ВОЗРАСТА В КОЛИЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕК НЕ МЕНЕЕ**

- А) 50
- Б) 100
- В) 30
- Г) 20

**12. [T002049] КАЛИБРОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ПРОВОДИТСЯ НА ЭТАПЕ**

- А) подготовительном
- Б) обследования
- В) анализа результатов
- Г) промежуточном

**13. [T002050] ПРИ КАЛИБРОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ, СОВПАДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ (%)**

- А) 85
- Б) 95
- В) 75
- Г) 55

**14. [T002051] КОЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕВЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ВОЗ**

- А) 5
- Б) 7
- В) 4
- Г) 3

**15. [T002052] МЕТОДИКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ВОЗ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ (ЛЕТ)**

А) 6, 12, 15

Б) 3, 6, 12

В) 6, 9, 12

Г) 9, 12, 15

**16. [T002053] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ВОЗ ОБСЛЕДУЮТ ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ (ЛЕТ)**

А) 35-44

Б) 30-40

В) 25-30

Г) 18-25

**17. [T002054] КЛЮЧЕВОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВОЗ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ (ЛЕТ)**

А) 12

Б) 15

В) 6

Г) 9

**18. [T002055] КЛЮЧЕВОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПО МЕТОДИКЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВОЗ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ (ЛЕТ)**

А) 15

Б) 12

В) 6

Г) 35-44

**19. [T002056] КЛЮЧЕВОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВОЗ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ (ЛЕТ)**

А) 6

Б) 3

В) 9

Г) 7

**20. [T002057] ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ИНДЕКСОМ**

- А) КПУ
- Б) Кпу
- В) РНР
- Г) РМА

**21. [T002058] ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ИНДЕКСОМ**

- А) КП
- Б) КПУ
- В) ИГР-У
- Г) РНР

**22. [T002059] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ВОЗ СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ОЦЕНИВАЕТСЯ ИНДЕКСОМ**

- А) СРІ
- Б) ОНІ-S
- В) РМА
- Г) РНР

**23. [T002060] ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ГИГИЕНИСТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

- А) регистрация данных обследования
- Б) осмотр населения
- В) проведение профилактических мероприятий
- Г) анализ результатов

**24. [T002061] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ВОЗ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ**

- А) зеркало, пародонтальный зонд
- Б) зеркало, пинцет
- В) зеркало, стоматологический зонд
- Г) стоматологический зонд, пинцет

**25. [T002062] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ВОЗ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗОНД**

- А) пародонтальный
- Б) стоматологический
- В) штыковидный
- Г) серповидный

**26. [T002063] ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ВОЗ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) карта для оценки стоматологического статуса
- Б) медицинская карта стоматологического больного
- В) история болезни пациента
- Г) журнал регистрации

**27. [T002064] КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ В ПОПУЛЯЦИИ (ВОЗ)**

- А) 3
- Б) 2
- В) 1
- Г) 5

**28. [T002065] КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ВОЗ (ЛЕТ)**

- А) 6, 12, 15, 35-44, 65 и старше
- Б) 3, 5, 12,18, 44-55, 75и старше
- В) 2, 6,15, 20, 35-44, 65и старше
- Г) 3, 6, 9, 15, 35-44 и старше

**29. [T002066] ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИНДЕКСА СРІ КОД 0 СООТВЕТСТВУЕТ ПРИЗНАКУ**

- А) здоровые ткани пародонта
- Б) отсутствие зубов в секстанте
- В) кровоточивость десны при зондировании
- Г) пародонтальный карман глубиной 6 мм и более

**30. [T002067] ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИНДЕКСА CP1TN КОД X СООТВЕТСТВУЕТ ПРИЗНАКУ**

- А) присутствие одного зуба в секстанте
- Б) здоровые ткани пародонта
- В) кровоточивость десны при зондировании
- Г) пародонтальный карман глубиной 6 мм и более

**31. [T002068] ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИНДЕКСА CP1 КОД X СООТВЕТСТВУЕТ ПРИЗНАКУ**

- А) отсутствие зубов в секстанте
- Б) здоровые ткани пародонта
- В) кровоточивость десны при зондировании
- Г) пародонтальный карман глубиной 4-5 мм

**32. [T002069] ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИНДЕКСА CP1 КОД 4 ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЛИЧИЕ**

- А) пародонтального кармана глубиной 6 мм и более
- Б) зубного камня
- В) пародонтального кармана глубиной 4-5 мм
- Г) кровоточивости десны при зондировании

**33. [T002070] ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИНДЕКСА CP1 КОД 3 ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЛИЧИЕ**

- А) пародонтального кармана глубиной 4-5 мм
- Б) зубного камня
- В) кровоточивости десны при зондировании
- Г) пародонтального кармана глубиной 6 мм и более

**34. [T002071] ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИНДЕКСА CP1 КОД 1 ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЛИЧИЕ**

- А) кровоточивости десны при зондировании
- Б) зубного камня
- В) пародонтального кармана глубиной 4-5 мм
- Г) пародонтального кармана глубиной 6 мм и >

**35. [T002072] ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИНДЕКСА CP1 КОД 2 ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЛИЧИЕ**

- А) зубного камня
- Б) кровоточивости десны при зондировании
- В) пародонтального кармана глубиной 4-5 мм
- Г) пародонтального кармана глубиной 6 мм и >

**36. [T002073] ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИНДЕКСА СРІ НАЛИЧИЕ ПАРОДОНТАЛЬНОГО КАРМАНА ГЛУБИНОЙ 4-5 ММ СООТВЕТСТВУЕТ КОДУ**

- А) 3
- Б) 1
- В) 2
- Г) 4

**37. [T002074] ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИНДЕКСА СРІ НАЛИЧИЕ ЗУБНОГО КАМНЯ СООТВЕТСТВУЕТ КОДУ**

- А) 2
- Б) 1
- В) 3
- Г) 4

**38. [T002075] УРОВНИ ОЦЕНКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ В ПОПУЛЯЦИИ (ВОЗ)**

- А) низкий, средний, высокий
- Б) оптимальный, умеренный, повышенный
- В) недостаточный, средний, высокий
- Г) низкий, оптимальный, высокий

**39. [T002076] ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ КАРИЕСОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДЕКСОМ**

- А) КПУ
- Б) СРІТН
- В) ГИ (по Федорову-Володкиной)
- Г) РМА

**40. [T002077] ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КАРИОЗНЫХ ПЯТЕН МЕТОДОМ ОКРАШИВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) 2% р-р метиленового синего
- Б) р-р Шиллера-Писарева
- В) р-р йодистого калия
- Г) р-р фуксина



**41. [T002078] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЭМАЛИ ПРОРЕЗАВШИХСЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У КАРИЕСВОСПРИИМЧИВЫХ ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) 10% р-р глюконата кальция
- Б) 30% р-р нитрата серебра
- В) капрофер
- Г) 1-2% р-р фторида натрия

**42. [T002079] ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАРИЕСРЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭМАЛИ ЗУБОВ У ПАЦИЕНТА НАЗНАЧАЮТ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА**

- А) лактат или глюконат кальция
- Б) фитин
- В) метилурацил
- Г) магния сульфат

**43. [T002080] ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭМАЛИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГЛЮКОНАТА КАЛЬЦИЯ**

- А) понижается
- Б) повышается
- В) не изменяется
- Г) постепенно увеличивается

**44. [T002081] ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ФТОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ (В УМЕРЕННЫХ ШИРОТАХ)\_\_\_МГ/Л**

- А) 1,0-1,2
- Б) 0,3-0,8
- В) 0,5-0,9
- Г) 2,3-3,0

**45. [T002082] ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА ИСПОЛЬЗУЮТ ИНДЕКС**

- А) SPITN
- Б) КП
- В) КПУ
- Г) Грина-Вермиллиона

**46. [T002083] ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ГИНГИВИТА, А В ПОСЛЕДУЮЩЕМ РЕГИСТРАЦИИ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗУЮТ ИНДЕКС**

- А) РМА
- Б) кп
- В) КПУ
- Г) СРІТН

**47. [T002084] ДЛЯ ОЦЕНКИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ ДО 5-6 ЛЕТ ПРИМЕНЯЮТ ИНДЕКС**

- А) Федорова-Володкиной
- Б) СРІТН
- В) Грина-Вермиллиона
- Г) РМА

**48. [T002085] ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗУБНОГО НАЛЕТА И ЗУБНОГО КАМНЯ ПРИМЕНЯЮТ ИНДЕКС**

- А) Грина-Вермиллиона
- Б) СРІТН
- В) РМА
- Г) КПУ+кп

**49. [T002086] ОЦЕНКА РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ СЛЮНЫ - ЭТО**

- А) кривая Стефана
- Б) КОСРЭ-тест
- В) ТЭР-тест
- Г) Са/Р коэффициент

**50. [T002087] ЧИСЛО ПОРАЖЕННЫХ КАРИЕСОМ ЗУБОВ У ИНДИВИДУМА ОПРЕДЕЛЯЕТ**

- А) интенсивность
- Б) распространенность
- В) прирост интенсивности
- Г) СРІТН

**51. [T002088] ТОЧЕЧНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ПРИ ЗОНДИРОВАНИИ ДЕСНЕВОГО ЖЕЛОБКА В ОБЛАСТИ МЕЖЗУБНОГО ДЕСНЕВОГО СОСОЧКА ПО МЮЛЕМАНУ СООТВЕТСТВУЕТ**

- А) 1 баллу
- Б) 0 баллов
- В) 2 баллам
- Г) 3 баллам

**52. [T002089] ПРИ ЗОНДИРОВАНИИ ДЕСНЕВОГО ЖЕЛОБКА НАБЛЮДАЕТСЯ КРОВОТОЧИВОСТЬ В ВИДЕ НЕБОЛЬШОГО ПЯТНА, НЕ ВЫТЕКАЮЩЕГО ЗА ПРЕДЕЛЫ ДЕСНЕВОГО ЖЕЛОБКА, ВИСИТ КАПЛЕЙ. ПО МЮЛЕМАНУ КРОВОТОЧИВОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ**

- А) 2 баллам
- Б) 0 баллам
- В) 1 баллу
- Г) 3 баллам

**53. [T002090] СРАЗУ ПОСЛЕ ЗОНДИРОВАНИЯ ДЕСНЕВОГО ЖЕЛОБКА ПОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ПЯТНО, ВЫТЕКАЮЩЕЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДЕСНЕВОГО ЖЕЛОБКА ВПЛОТЬ ДО ПЕРЕХОДНОЙ СКЛАДКИ. ПО МЮЛЕМАНУ КРОВОТОЧИВОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ В \_\_\_ БАЛЛАХ**

- А) 4
- Б) 3
- В) 1
- Г) 2

**54. [T002091] РАСТВОР ФУКСИНА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА**

- А) ИГ (по Федорову-Володкиной)
- Б) РМА
- В) СРІТN
- Г) ПИ (по Русселю)

**55. [T002092] ИНДЕКС РМА ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЯЖЕСТЬ**

- А) гингивита
- Б) пародонтоза
- В) пародонтита
- Г) кариеса

**56. [T002093] ЧТО ПРИМЕНЯЮТ ПАЦИЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ**

- А) таблетки "Динал"
- Б) р-р фуксина
- В) р-р Люголя
- Г) таблетки эритрозина

**57. [T002094] ИНДЕКС ГИНГИВИТА (РМА) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- А) количественно и качественно
- Б) качественно
- В) количественно
- Г) не существует данного индекса

**58. [T002095] ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ ОЦЕНИВАЕТСЯ ИНДЕКСОМ**

- А) кп (п)
- Б) КПУ (п)
- В) КПУ (з)
- Г) кп (з)

**59. [T002096] ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ ОЦЕНИВАЕТСЯ ИНДЕКСОМ**

- А) КПУ (п)
- Б) КПУ (з)
- В) кп (п)
- Г) кп (з)

**60. [T002097] ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ ОЦЕНИВАЕТСЯ ИНДЕКСОМ**

- А) КПУ (з)
- Б) КПУ (п)
- В) кп (п)
- Г) кп (з)

**61. [T002098] ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ ОЦЕНИВАЕТСЯ ИНДЕКСОМ**

- А) кп (з)
- Б) КПУ (п)
- В) КПУ (з)
- Г) кп (п)

**62. [T002099] К ЗУБНЫМ ОТЛОЖЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ**

- А) мягкий зубной налет, зубная бляшка, пищевые остатки, зубной камень
- Б) мягкий зубной налет
- В) мягкий зубной налет, зубная бляшка
- Г) мягкий зубной налет, зубная бляшка, пищевые остатки

**63. [T002100] ЭЛЕВАТОР ЛЕКЛЮЗА – ЭТО ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ**

- А) удаления корней зубов
- Б) снятия искусственных коронок
- В) лечения кариеса
- Г) снятия зубного камня

**64. [T002101] НЕОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА БОЛЬШЕ ВСЕГО СОДЕРЖИТСЯ**

- А) в эмали
- Б) в дентине
- В) в пульпе
- Г) в цементе

**65. [T002102] ДЛЯ ОСТРОГО ПЕРИОДОНТИТА ХАРАКТЕРНО**

- А) резкая болезненность при перкуссии
- Б) безболезненное зондирование
- В) боль от химических раздражителей
- Г) постоянная боль

**66. [T002103] ЕСЛИ ЗУБ ПОДВИЖЕН В ВЕСТИБУЛЯРНО-ОРАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ТО ЭТО**

- А) 1 степень
- Б) 2 степень
- В) 3 степень
- Г) 4 степень

**67. [T002104] ПРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ ЗУБАМИ**

- А) тремы
- Б) протрузия
- В) тортоаномалии
- Г) дистопии

**68. [T002105] НАЗОВИТЕ МЕСТНЫЙ КАРИЕСОГЕННЫЙ ФАКТОР**

- А) зубной налет
- Б) диета
- В) функциональное состояние зубов
- Г) экстремальные воздействия

**69. [T002106] ДИАСТЕМА - ЭТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ**

- А) центральными резцами более 1 мм
- Б) центральными и боковыми резцами более 1 мм
- В) премолярами более 1 мм
- Г) премолярами и молярами больше 1 мм

**70. [T002107] ЛОЖНЫЙ ПАРОДОНТАЛЬНЫЙ КАРМАН ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- А) гипертрофического гингивита
- Б) пародонтоза
- В) катарального гингивита
- Г) пародонтита

**71. [T002108] В ЗУБНОЙ ФОРМУЛЕ КАРИЕС ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИМВОЛОМ**

- А) С
- Б) Ks
- В) Ka
- Г) Car

**72. [T002109] В ЗУБНОЙ ФОРМУЛЕ ПАРОДОНТИТ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИМВОЛОМ**

- А) A
- Б) P
- В) Pt
- Г) X

**73. [T002110] В ЗУБНОЙ ФОРМУЛЕ ИНТАКТНЫЙ ЗУБ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИМВОЛОМ**

- А) установленный символ отсутствует
- Б) С
- В) 0
- Г) И

**74. [T002111] В ЗУБНОЙ ФОРМУЛЕ ИСКУССТВЕННЫЙ ЗУБ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИМВОЛОМ**

- А) И
- Б) Иск
- В) С
- Г) установленный символ отсутствует

**75. [T002112] В ЗУБНОЙ ФОРМУЛЕ ИСКУССТВЕННАЯ КОРОНКА ЗУБА ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИМВОЛОМ**

- А) К
- Б) Иск
- В) И
- Г) С

**76. [T002113] ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КАРИЕСОМ – ЭТО**

- А) число впервые выявленных случаев заболевания за определенный промежуток времени
- Б) число людей, имеющих заболевание на момент обследования
- В) число кариозных, запломбированных и удаленных зубов у одного обследуемого
- Г) среднее количество кариозных, удаленных и запломбированных зубов в группе населения

**77. [T002114] ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

- А) расспрос, осмотр, зондирование, перкуссия, пальпация
- Б) расспрос, осмотр, термодиагностика
- В) оценка гигиенического состояния, опрос, осмотр
- Г) термодиагностика, рентгенодиагностика

**78. [T002116] ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСМОТРА ЗУБНЫХ РЯДОВ:**

- А) верхний ряд - справа налево, нижний ряд - слева направо
- Б) нижний ряд - справа налево, верхний ряд - справа налево
- В) верхний ряд - слева направо, нижний ряд - справа налево
- Г) центральные резцы верхней и нижней челюсти, коренные зубы слева и справа на верхней и нижней челюсти

**79. [T002117] ВНУТРИРОТОВОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОСМОТР**

- А) преддверия полости рта, прикуса, слизистой оболочки полости рта, твердых тканей зубов, тканей пародонта.
- Б) кожных покровов, преддверия полости рта, слизистой оболочки полости рта
- В) носогубных складок, преддверия полости рта, слизистой оболочки полости рта, тканей пародонта.
- Г) преддверия полости рта, тканей пародонта, твердых тканей зубов

**80. [T002121] ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА**

- А) жалобы, анамнез, внешний осмотр, осмотр полости рта
- Б) анамнез, жалобы, внешний осмотр, осмотр полости рта
- В) внешний осмотр, жалобы, анамнез, осмотр полости рта
- Г) внешний осмотр, осмотр полости рта жалобы, анамнез,

**81. [T002122] ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- А) о стоматологической заболеваемости населения
- Б) о состоянии окружающей среды
- В) об имеющемся персонале и материальных ресурсах
- Г) о динамике демографических процессов в регионе

**82. [T002123] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ, КАЖДЫЙ ЗУБ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ЦИФРАМИ**

- А) двумя
- Б) одной
- В) тремя
- Г) пятью



**83. [T002124] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ В ПОСТОЯННОМ ПРИКУСЕ ЗУБНЫЕ РЯДЫ ДЕЛЯТСЯ НА КВАДРАНТЫ, КОТОРЫЕ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРАМИ**

- А) 1,2,3,4
- Б) 5,6,7,8
- В) I, II, III, IV
- Г) V, VI, VII, VIII

**84. [T002125] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ВО ВРЕМЕННОМ ПРИКУСЕ ЗУБНЫЕ РЯДЫ ДЕЛЯТСЯ НА КВАДРАНТЫ, КОТОРЫЕ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРАМИ**

- А) 5,6,7,8
- Б) 1,2,3,4
- В) I, II, III, IV
- Г) V, VI, VII, VIII

**85. [T002126] ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КВАДРАНТА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРОЙ**

- А) 2
- Б) 1
- В) 3
- Г) 4

**86. [T002127] ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ ПРАВОГО НИЖНЕГО КВАДРАНТА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРОЙ**

- А) 4
- Б) 1
- В) 2
- Г) 3

**87. [T002128] ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ ЛЕВОГО НИЖНЕГО КВАДРАНТА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРОЙ**

- А) 3
- Б) 1
- В) 2
- Г) 4

**88. [T002129] ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ ПРАВОГО ВЕРХНЕГО КВАДРАНТА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРОЙ**

- A) 1
- Б) 2
- В) 3
- Г) 4

**89. [T002130] ВРЕМЕННЫЕ ЗУБЫ ЛЕВОГО НИЖНЕГО КВАДРАНТА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРОЙ**

- A) 7
- Б) 8
- В) 6
- Г) 5

**90. [T002131] ВРЕМЕННЫЕ ЗУБЫ ПРАВОГО НИЖНЕГО КВАДРАНТА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРОЙ**

- A) 8
- Б) 7
- В) 6
- Г) 5

**91. [T002132] ВРЕМЕННЫЕ ЗУБЫ ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КВАДРАНТА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРОЙ**

- A) 6
- Б) 5
- В) 7
- Г) 8

**92. [T002133] ВРЕМЕННЫЕ ЗУБЫ ПРАВОГО ВЕРХНЕГО КВАДРАНТА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРОЙ**

- A) 5
- Б) 6
- В) 7
- Г) 8

**93. [T002134] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ 7.3 ЗУБ - ЭТО**

- А) нижний левый временный клык
- Б) верхний левый постоянный клык
- В) верхний правый постоянный клык
- Г) нижний правый временный клык

**94. [T002135] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ПОСТОЯННЫЙ НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ПЕРВЫЙ ПРЕМОЛЯР - ЭТО ЗУБ**

- А) 4.4
- Б) 3.4
- В) 2.4
- Г) 1.4

**95. [T002136] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ 3.4 ЗУБ - ЭТО**

- А) постоянный левый нижний первый премоляр
- Б) постоянный правый верхний первый премоляр
- В) временный правый нижний первый премоляр
- Г) временный левый верхний первый премоляр

**96. [T002137] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ ВРЕМЕННЫЙ ВТОРОЙ МОЛЯР - ЭТО ЗУБ**

- А) 6.5
- Б) 2.7
- В) 5.5
- Г) 1.7

**97. [T002138] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ЗУБ 4.6 – ЭТО МОЛЯР**

- А) правый нижний первый
- Б) левый нижний второй
- В) правый верхний второй
- Г) левый верхний первый

**98. [T002139] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ ВТОРОЙ ПРЕМОЛЯР - ЭТО ЗУБ**

- А) 2.5
- Б) 1.5
- В) 2.6
- Г) 5.5

**99. [T002140] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ЗУБ 6.4 - ЭТО**

- А) левый верхний первый временный моляр
- Б) правый верхний первый постоянный премоляр
- В) левый верхний первый постоянный премоляр
- Г) правый нижний первый временный моляр

**100. [T002141] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ПЕРВЫЙ ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕЦ - ЭТО ЗУБ**

- А) 7.1
- Б) 4.1
- В) 3.1
- Г) 8.1

**101. [T002142] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ 5.2 ЗУБ - ЭТО**

- А) верхний правый второй временный резец
- Б) нижний правый второй временный резец
- В) верхний левый второй временный резец
- Г) нижний левый второй постоянный резец

**102. [T002143] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ВРЕМЕННЫЙ ПЕРВЫЙ МОЛЯР - ЭТО ЗУБ**

- А) 8.4
- Б) 4.6
- В) 5.4
- Г) 3.6

**103. [T002144] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ ПОСТОЯННЫЙ КЛЫК - ЭТО ЗУБ**

- А) 1.3
- Б) 2.3
- В) 3.3
- Г) 4.3

**104. [T002145] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ 4.5 ЗУБ - ЭТО**

- А) нижний правый второй премоляр
- Б) нижний правый временный второй моляр
- В) верхний левый второй премоляр
- Г) верхний левый временный второй моляр

**105. [T002146] ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗУБОВ НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ВРЕМЕННЫЙ КЛЫК - ЭТО ЗУБ**

- А) 7.3
- Б) 3.3
- В) 6.3
- Г) 1.3

**106. [T002147] СБОР ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА ВКЛЮЧАЕТ**

- А) жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни
- Б) анамнез заболевания, анамнез жизни
- В) жалобы, анамнез заболевания
- Г) жалобы, анамнез жизни

**107. [T002148] ИНДЕКСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА**

- А) СРІТN, РМА
- Б) РНР, ИГР-У
- В) КПУ, кпу
- Г) РМА, РНР

**108. [T002149] ИНДЕКСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА**

- А) РНР, ИГР-У
- Б) КПУ, кпу
- В) СРІТН, РМА
- Г) РМА, СРІ

**109. [T002152] ТЭР-ТЕСТ - ЭТО ОЦЕНКА РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЗУБОВ К КАРИЕСУ ПО**

- А) степени кислотоустойчивости эмали
- Б) степени активности кариозного процесса
- В) степени реминерализирующей активности слюны
- Г) степени деминерализации

**110. [T002153] ЗУБЫ ІІ ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ**

- А) на 6-8 мес. жизни ребенка
- Б) на 4-5 мес. жизни ребенка
- В) на 5-6 мес. жизни ребенка
- Г) на 9-10 мес. жизни ребенка

**111. [T002154] ЗУБЫ ІІІ ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ**

- А) на 7-8 мес жизни ребенка
- Б) на 12-17 мес жизни ребенка
- В) на 6-12 мес жизни ребенка
- Г) на 2-5 мес жизни ребенка

**112. [T002155] ЗУБЫ ІІІІ ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ**

- А) на 16-20 мес. жизни ребенка
- Б) на 12-15 мес. жизни ребенка
- В) на 10-12 мес. жизни ребенка
- Г) на 8-10 мес. жизни ребенка

**113. [T002156] ЗУБЫ ІV|ІV ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ**

- А) на 12-16 мес. жизни ребенка
- Б) на 17-20 мес. жизни ребенка
- В) на 10-15 мес. жизни ребенка
- Г) на 9-12 мес. жизни ребенка

**114. [T002157] ЗУБЫ V|V ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ**

- А) на 20-30 мес. жизни ребенка
- Б) на 10-12 мес. жизни ребенка
- В) на 12-18 мес. жизни ребенка
- Г) на 9-10 мес. жизни ребенка

**115. [T002158] ЗУБЫ 1|1 ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ В \_\_\_\_ ЛЕТ**

- А) 6-7
- Б) 8
- В) 5-6
- Г) 6-8

**116. [T002159] ЗУБЫ 2|2 ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ В \_\_\_\_ ЛЕТ**

- А) 6-8
- Б) 8
- В) 5-7
- Г) 5-6

**117. [T002160] ЗУБЫ 3|3 ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ В \_\_\_\_ ЛЕТ**

- А) 9-10
- Б) 7-11
- В) 5-7
- Г) 7-9

**118. [T002161] ЗУБЫ 54|45 ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ В \_\_\_\_ ЛЕТ**

- А) 8-10
- Б) 8-12
- В) 7-11
- Г) 5-7

**119. [T002162] ЗУБЫ 6|6 ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ**

- А) в 5-7 л
- Б) в 7-9 л
- В) в 8-10 л
- Г) в 7-11 л

**120. [T002164] ХОРОШЕМУ УРОВНЮ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПО ФЕДОРОВУ-ВОЛОДКИНОЙ СООТВЕТСТВУЮТ ЗНАЧЕНИЯ**

А) 1,1-1,5

Б) 2,6-3,4

В) 1,6-2,0

Г) 2,1-2,5

**121. [T002165] УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМУ УРОВНЮ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПО ФЕДОРОВУ-ВОЛОДКИНОЙ СООТВЕТСТВУЮТ ЗНАЧЕНИЯ**

А) 1,6-2,0

Б) 1,1-1,5

В) 2,1-2,5

Г) 2,6-3,4

**122. [T002166] НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМУ УРОВНЮ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПО ФЕДОРОВУ-ВОЛОДКИНОЙ СООТВЕТСТВУЮТ ЗНАЧЕНИЯ**

А) 2,1-2,5

Б) 1,1-1,5

В) 2,6-3,4

Г) 1,6-2,0

**123. [T002167] ПЛОХОМУ УРОВНЮ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПО ФЕДОРОВУ-ВОЛОДКИНОЙ СООТВЕТСТВУЮТ ЗНАЧЕНИЯ**

А) 2,6-3,4

Б) 2,1-2,5

В) 1,6-2,0

Г) 1,1-1,5

**124. [T002168] ОЧЕНЬ ПЛОХОМУ УРОВНЮ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПО ФЕДОРОВУ-ВОЛОДКИНОЙ СООТВЕТСТВУЮТ ЗНАЧЕНИЯ**

А) 3,5-5,0

Б) 2,1-2,5

В) 1,6-2,0

Г) 1,1-1,5



**125. [T002169] РАСТВОР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ 2 Г ЙОДА, 4 Г ЙОДИСТОГО КАЛИЯ, 200 МЛ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ, ЭТО**

- А) р-р йод-йодистого калия
- Б) р-р Шиллера-Писарева
- В) р-р Люголя
- Г) р-р фуксина

**126. [T002171] ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ**

- А) клинико-рентгенологической картины
- Б) клинических данных
- В) жалоб больного
- Г) опроса больного

**127. [T002172] ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) патологическая подвижность верхнечелюстных костей
- Б) патологическая подвижность нижней челюсти
- В) носовое кровотечение
- Г) головная боль

**128. [T002173] ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) патологическая подвижность нижней челюсти
- Б) патологическая подвижность верхнечелюстных костей
- В) носовое кровотечение
- Г) головная боль

**129. [T002174] К ПУ(З) - ЭТО ИНДЕКС**

- А) интенсивности кариеса постоянных зубов
- Б) гигиены полости рта
- В) интенсивности кариеса поверхностей
- Г) интенсивности кариеса временных зубов

**130. [T002176] ОСНОВНОЙ МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО**

- А) клинический
- Б) цитологический
- В) рентгенологический
- Г) лабораторный

**131. [T002177] ПРИ ВНЕРОТОВОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЯЮТ**

- А) изменение конфигурации лица и ограничение подвижности нижней челюсти
- Б) наличие сверхкомплектных зубов
- В) цвет и влажность слизистой оболочки полости рта
- Г) состояние зубов больного

**132. [T002178] ОБЪЕМ ТКАНЕЙ, ОБСЛЕДУЕМЫХ ПРИ ОСМОТРЕ ПОЛОСТИ РТА**

- А) все области и ткани полости рта
- Б) слизистая оболочка полости рта и «причинный зуб»
- В) зубы
- Г) язык

**133. [T002180] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОСТИ РТА ПРОВОДЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ**

- А) цитологическое
- Б) маммографию
- В) ирригоскопию
- Г) сцинтиграфию

**134. [T002181] НА ОРТОПАНТОМОГРАММЕ ПОЛУЧАЮТ**

- А) развернутое рентгеновское изображение верхней и нижней челюстей
- Б) развернутое рентгеновское изображение нижней челюсти
- В) рентгеновское изображение височно-нижнечелюстного сустава
- Г) развернутое рентгеновское изображение верхней челюсти

**135. [T002182] ОККЛЮЗИОГРАММА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

- А) окклюзионных контактов
- Б) окклюзионной высоты
- В) выносливости тканей пародонта
- Г) состояния ВНЧС

**136. [T002183] ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КАРИОЗНЫХ ПЯТЕН МЕТОДОМ ОКРАШИВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) 2% раствор метиленового синего
- Б) реактив Шиллера-Писарева
- В) раствор йодистого калия
- Г) р-р эритрозина

**137. [T002184] ВЕДУЩИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМЫ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) рентгенологический
- Б) трансиллюминационный
- В) определение индекса РМА
- Г) ЭОД

**138. [T002185] МЕСТНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) неудовлетворительная гигиена полости рта
- Б) высокое содержание фторида в питьевой воде
- В) низкое содержание фторида в питьевой воде
- Г) сопутствующие соматические заболевания

**139. [T002186] СИСТЕМНЫЙ ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА**

- А) сахарный диабет
- Б) нарушение техники чистки зубов
- В) аномалии положения зубов
- Г) зубной камень

**140. [T002188] ВЫСОКОУГЛЕВОДНАЯ ДИЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ**

- А) кариеса зубов
- Б) истирания эмали
- В) эрозии эмали
- Г) флюороза зубов

**141. [T002189] ЭНДОГЕННЫМ (СИСТЕМНЫМ) ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) низкое содержание фторида в питьевой воде
- Б) высокое содержание фторида в питьевой воде
- В) сопутствующие соматические заболевания
- Г) зубной налет

**142. [T002190] ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) неудовлетворительная гигиена полости рта
- Б) высокое содержание фторида в питьевой воде
- В) высокая скорость секреции слюны
- Г) низкоуглеводная пища

**143. [T002191] В ПЕРИОД ПРОРЕЗЫВНИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ ПОВЫШАЕТСЯ РИСК РАЗВИТИЯ**

- А) кариеса зубов
- Б) флюороза зубов
- В) гипоплазии эмали
- Г) эрозии эмали

**144. [T002192] ПРИЧИНОЙ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ФЛЮОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) повышенное содержание фторида в питьевой воде
- Б) пониженное содержание фторида в питьевой воде
- В) наследственная предрасположенность
- Г) инфекционное заболевание ребенка

**145. [T002193] ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕСТНОЙ ГИПОПЛАЗИИ ЭМАЛИ ПОСТОЯННОГО ЗУБА**

- А) травма фолликула постоянного зуба
- Б) наследственность
- В) заболевания ребенка на первом году жизни
- Г) осложненное течение беременности

**146. [T002195] ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИПОПЛАЗИИ ЭМАЛИ**

- А) осложненное течение беременности
- Б) неудовлетворительная гигиена полости рта
- В) употребление углеводистой пищи
- Г) низкое содержание фторидов в питьевой воде

**147. [T002197] ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ФЛЮОРОЗА**

- А) повышенное содержание фторида в питьевой воде
- Б) пониженное содержание фторида в питьевой воде
- В) наследственная предрасположенность
- Г) алиментарный дефицит кальция

**148. [T002198] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТКОЙ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ –ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ**

- А) клиновидного дефекта
- Б) гипоплазии эмали
- В) кариеса зубов
- Г) флюороза зубов

**149. [T002200] ФАКТОР РИСКА ПОВЫШЕННОГО СТИРАНИЯ ЗУБОВ**

- А) нарушение окклюзии
- Б) неудовлетворительная гигиена полости рта
- В) высокое содержание фторидов в питьевой воде
- Г) низкое содержание фторидов в питьевой воде

**150. [T002201] ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЭРОЗИИ ЗУБОВ СПОСОБСТВУЕТ ЧАСТОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ**

- А) кислых
- Б) холодных
- В) твердых
- Г) липких

**151. [T002202] ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЭРОЗИИ ЗУБОВ СПОСОБСТВУЕТ ЧАСТОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАПИТКОВ**

- А) кислых
- Б) холодных
- В) теплых
- Г) алкогольных

**152. [T002203] ГРУППОЙ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФЛЮОРОЗА ЗУБОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАСЕЛЕНИЕ, ПРОЖИВАЮЩЕЕ В МЕСТНОСТИ С**

- А) высоким содержанием фторидов в питьевой воде
- Б) низким содержанием фторидов в питьевой воде
- В) оптимальным содержанием фторидов в питьевой воде
- Г) средним содержанием фторидов в питьевой воде

**153. [T002204] ГРУППОЙ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА ЯВЛЯЕТСЯ НАСЕЛЕНИЕ, ПРОЖИВАЮЩЕЕ В МЕСТНОСТИ С**

- А) низким содержанием фторидов в питьевой воде
- Б) высоким содержанием фторидов в питьевой воде
- В) оптимальным содержанием фторидов в питьевой воде
- Г) средним содержанием фторидов в питьевой воде

**154. [T002206] К ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ В АНТЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОТНОСЯТ**

- А) наследственные факторы
- Б) курение родителей
- В) несбалансированная диета беременной
- Г) прием антибиотиков

**155. [T002207] К ОБЩИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОТНОСЯТ**

- А) позотонические состояния
- Б) вредные привычки
- В) инфантильный тип глотания
- Г) аномалии развития уздечек губ

**156. [T002208] К ОБЩИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОТНОСЯТ**

- А) заболевания ребенка
- Б) вредные привычки
- В) инфантильный тип глотания
- Г) аномалии развития уздечек губ

**157. [T002209] К МЕСТНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОТНОСЯТ**

- А) аномалии развития уздечек губ
- Б) родовая травма
- В) рахит
- Г) недоношенность

**158. [T002210] К МЕСТНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОТНОСЯТ**

- А) инфантильный тип глотания
- Б) родовая травма
- В) рахит
- Г) недоношенность

**159. [T002211] К МЕСТНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОТНОСЯТ**

- А) применение соски-пустышки старше 1 года
- Б) родовая травма
- В) рахит
- Г) позотонические состояния

**160. [T002213] ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ УДАЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ - ФАКТОР РИСКА**

- А) задержки прорезывания постоянных зубов
- Б) кариеса зубов
- В) гипоплазии эмали
- Г) пародонтита

**161. [T002214] МЕСТНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) зубной налет
- Б) эндокринная патология
- В) загрязнение окружающей среды
- Г) беременность

**162. [T002215] МЕСТНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) снижение слюноотделения
- Б) сахарный диабет
- В) загрязнение окружающей среды
- Г) беременность

**163. [T002216] СИСТЕМНЫЙ ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА**

- А) период полового созревания
- Б) неудовлетворительная гигиена полости рта
- В) аномалии положения зубов
- Г) аномалии развития оболочки полости рта

**164. [T002217] СИСТЕМНЫЙ ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА**

- А) беременность
- Б) нарушение техники чистки зубов
- В) аномалии положения зубов
- Г) аномалии развития оболочки полости рта

**165. [T002218] К ОБЩИМ ФАКТОРАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ ОТНОСЯТСЯ**

- А) наследственность, неполноценная диета, соматические заболевания, сдвиги в функциональном состоянии органов и систем в период формирования и созревания тканей зуба
- Б) зубной камень, зубная бляшка
- В) нарушение состава и свойств ротовой жидкости
- Г) отсутствие зубов

**166. [T002219] К МЕСТНЫМ ФАКТОРАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ ОТНОСЯТСЯ**

- А) плохая гигиена полости рта, резистентность тканей зуба, состояние зубочелюстной системы в период закладки, развития и прорезывания зубов, питьевая вода
- Б) неполноценная диета
- В) соматические заболевания
- Г) резистентность тканей зуба



**167. [T002220] ЗА ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ МОЖЕТ ПОСЛЕДОВАТЬ**

- А) уголовное наказание
- Б) дисциплинарное взыскание
- В) административное взыскание
- Г) законом РФ наказаний не предусмотрено

**168. [T002221] К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ В ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТНОСЯТСЯ**

- А) повреждение кожных покровов (проколы, порезы) медицинским инструментарием
- Б) попадание инфицированного материала на халат
- В) попадания инфицированного материала на одежду пациента
- Г) попадание инфицированного материала на шапочку и маску

**169. [T002226] ПРИЧИНОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕРИОСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) обострение хронического периодонтита
- Б) ушиб мягких тканей лица
- В) фиброма альвеолярного отростка
- Г) обострение хронического гайморита

**170. [T002228] ЕСЛИ ПРИЧИНОЙ ПЕРИОСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОКОРНЕВОЙ ЗУБ, ЕГО СЛЕДУЕТ ЗАПЛОМБИРОВАТЬ**

- А) при наличии дренажа
- Б) сразу после удаления дренажа
- В) после стихания воспалительных явлений
- Г) через неделю

**171. [T002230] НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПЕРФОРАЦИЯ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПРОИСХОДИТ ПРИ УДАЛЕНИИ**

- А) 18, 17, 16, 15, 14 или 24, 25, 26, 27, 28
- Б) 48, 47, 46, 45, 44 или 34, 35, 36, 37, 38
- В) 13, 12, 11 или 21, 22, 23
- Г) 12, 11 или 21, 22

**172. [T002231] ДИАГНОЗ ПЕРФОРАЦИИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ СТАВЯТ НА ОСНОВАНИИ**

- А) клинико-рентгенологической картины
- Б) рентгенологической картины
- В) жалоб больного
- Г) клинических данных

**173. [T002232] ДЕТЯМ 2 ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЧИЩАТЬ ЗУБЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ**

- А) гелевых зубных паст
- Б) зубных паст на меловой основе
- В) зубного порошка
- Г) гигиенических паст

**174. [T002233] ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧИСТКИ ЗУБОВ ПАЦИЕНТОМ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) способность пациента удалять налет со всех поверхностей зубов
- Б) метод, по которому происходит движение от зуба к зубу
- В) время, требуемое для чистки всех зубов
- Г) качество зубной щетки

**175. [T002234] РАЗМЕР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ**

- А) 30 мм
- Б) 20 мм
- В) 10 мм
- Г) 40 мм

**176. [T002235] ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КЛИНОВИДНОГО ДЕФЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) абфракция
- Б) лечение кариеса
- В) заболевание матери в период беременности
- Г) беременность

**177. [T002236] ОСНОВНЫМ ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) генетическая обусловленность
- Б) наличие вредных привычек
- В) травма зубов
- Г) кариес зубов

**178. [T002237] ЗУБНАЯ ЩЕТКА ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ В СРЕДНЕМ 1 РАЗ В**

- А) 2-3 месяца
- Б) неделю
- В) месяц
- Г) 6 месяцев

**179. [T002238] ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖЕВАТЕЛЬНУЮ РЕЗИНКУ ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ, СОСТАВЛЯЕТ (МИНУТ)**

- А) 5-10
- Б) 1-5
- В) 20-30
- Г) более 60

**180. [T002239] ЗУБНАЯ ЩЕТКА С ПРОДОЛЬНЫМ V-ОБРАЗНЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ**

- А) ухода за полостью рта пациентов с брекет-системами
- Б) очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
- В) очищения межзубных промежутков
- Г) ухода за полостью рта пациентов с заболеваниями пародонта

**181. [T002240] ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ЗУБНЫМ ЩЕТКАМ, ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ**

- А) искусственного волокна
- Б) натуральной щетины
- В) индикаторных щетинок
- Г) прямой ручки

**182. [T002241] В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В СОСТАВ ЗУБНЫХ ПАСТ ВВОДЯТ**

- А) экстракты лекарственных растений
- Б) фторид натрия
- В) карбонат кальция
- Г) карбамид

**183. [T002243] ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА PH РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ**

- А) снижается
- Б) увеличивается
- В) не изменяется
- Г) увеличивается после чистки зубов

**184. [T002244] ОЧИЩАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ГЕЛЕВЫХ ЗУБНЫХ ПАСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ЗУБНЫМИ ПАСТАМИ НА МЕЛОВОЙ ОСНОВЕ**

- А) ниже
- Б) выше
- В) одинакова
- Г) выше сразу после чистки зубов

**185. [T002245] В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ**

- А) кондитерские изделия
- Б) кисломолочные продукты
- В) зелень, овощи
- Г) сыры

**186. [T002246] В ВОЗРАСТЕ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 3 ЛЕТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПРОВОДЯТ С**

- А) родителями
- Б) детьми
- В) учителями
- Г) педиатрами

**187. [T002247] ПРИЧИНОЙ ИСТИРАНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ МОЖЕТ БЫТЬ**

- А) постоянное использование высокоабразивных средств гигиены полости рта
- Б) высокое содержание фторида в питьевой воде
- В) низкое содержание фторида в питьевой воде
- Г) употребление углеводистой пищи

**188. [T002248] МЕСТНЫМ КАРИЕСОГЕННЫМ ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) неполноценная диета и питьевая вода
- Б) функциональное состояние зубов
- В) экстремальные воздействия
- Г) зубная бляшка и зубной налет

**189. [T002249] К КОММУНАЛЬНЫМ МЕТОДАМ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ОТНОСЯТСЯ**

- А) фторирование питьевой воды
- Б) герметизация фиссур
- В) чистка зубов
- Г) санпросвет работа

**190. [T002250] ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ СОДЕРЖАНИИ ФТОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ФЛЮОРОЗ РАЗВИВАЕТСЯ НА ЗУБАХ**

- А) постоянного прикуса
- Б) сменного прикуса
- В) не развивается
- Г) молочного прикуса

**191. [T002251] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСКАНИЯ ПОЛОСТИ РТА РАСТВОРОМ ФТОРИДА НАТРИЯ (\_\_\_ МИН.)**

- А) 1-3
- Б) 7-9
- В) 10-15
- Г) 5-10

**192. [T002252] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – ЭТО КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА**

- А) предупреждение возникновения стоматологических заболеваний
- Б) предупреждение возникновения осложнений имеющихся заболеваний
- В) восстановление утраченных в результате стоматологических заболеваний функций
- Г) определение стоматологической заболеваемости населения

**193. [T002253] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – ЭТО КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА**

- А) предупреждение возникновения осложнений имеющихся заболеваний
- Б) предупреждение возникновения стоматологических заболеваний
- В) восстановление утраченных в результате стоматологических заболеваний функций
- Г) определение стоматологической заболеваемости населения

**194. [T002254] ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – ЭТО КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА**

- А) восстановление утраченных в результате стоматологических заболеваний функций
- Б) предупреждение возникновения осложнений имеющихся заболеваний
- В) предупреждение возникновения стоматологических заболеваний
- Г) определение стоматологической заболеваемости населения

**195. [T002255] К СИСТЕМНЫМ (ЭНДОГЕННЫМ) МЕТОДАМ ФТОРИДПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ОТНОСЯТ**

- А) фторирование питьевой воды
- Б) применение фторидсодержащих зубных паст
- В) аппликации фторидсодержащими растворами
- Г) покрытие зубов фторидсодержащим лаком

**196. [T002256] ЭКЗОГЕННЫМ МЕТОДОМ ФТОРИДПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) покрытие зубов фторидсодержащим лаком
- Б) употребление фторированой питьевой воды
- В) употребление фторированого молока
- Г) прием таблеток фторида натрия

**197. [T002258] ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ФИССУР ПЕРВЫХ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ В ВОЗРАСТЕ (ЛЕТ)**

- А) 6 – 7
- Б) 10 – 11
- В) 12 -13
- Г) 15-18

**198. [T002259] ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ФИССУР ВТОРЫХ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ В ВОЗРАСТЕ (ЛЕТ)**

- А) 12 -13
- Б) 10 – 11
- В) 6 – 7
- Г) 15-18

**199. [T002260] ВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР ПРЕМОЛЯРОВ**

- А) 10 – 11лет
- Б) 6 – 7 лет
- В) 12 -13 лет
- Г) 15-18лет

**200. [T002261] ИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР ЗУБОВ В ОТЛИЧИЕ ОТ НЕИНВАЗИВНОГО МЕТОДА ВКЛЮЧАЕТ ЭТАП**

- А) препарирования твердых тканей фиссуры в пределах эмали
- Б) изоляции зуба от ротовой жидкости
- В) профессионального очищения фиссуры
- Г) диагностики состояния фиссуры

**201. [T002262] ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) наличие узких глубоких фиссур на жевательной поверхности
- Б) страх стоматологического вмешательства
- В) кариес дентина
- Г) интактность зубов более двух лет после прорезывания

**202. [T002263] АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕТОДА ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) кариес дентина
- Б) неполное прорезывание коронки зуба
- В) кариес эмали
- Г) повышенное содержание фторида в питьевой воде

**203. [T002264] ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ НАДЕЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБА ОТ СЛЮНЫ ВО ВРЕМЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР МАТЕРИАЛОМ ВЫБОРА СЛУЖИТ**

- А) стеклоиономерный цемент
- Б) светоотверждаемый герметик
- В) химиотверждаемый герметик
- Г) компомер

**204. [T002266] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ФЛЮОРОЗА ЗУБОВ В ЭНДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) замена водоисточника
- Б) использование фторидсодержащих зубных паст
- В) полноценное питание ребенка на первом году жизни
- Г) прием фторидсодержащих таблеток

**205. [T002267] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ У БЕРЕМЕННЫХ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ**

- А) воздушно-абразивного
- Б) звукового
- В) ультразвукового
- Г) инструментального

**206. [T002268] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) проведение профессиональной гигиены полости рта
- Б) употребление фторированной питьевой воды
- В) применение антибиотиков тетрациклинового ряда
- Г) герметизация фиссур



**207. [T002269] ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНСТРУМЕНТЫ**

- А) скейлеры, кюреты, долота, мотыги
- Б) экскаватор, штопфер, гладилку
- В) зонд, зеркало, пинцет, элеватор
- Г) дрельборы, пульпоэкстракторы, пинцет, экскаватор

**208. [T002270] ПРИМЕНЕНИЕ ТАБЛЕТОК ФТОРИДА НАТРИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ ЭФФЕКТИВНО С ВОЗРАСТА (ЛЕТ)**

- А) 2
- Б) 5
- В) 6
- Г) 9

**209. [T002271] ПРИМЕНЕНИЕ ФТОРИРОВАННОГО МОЛОКА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ ЭФФЕКТИВНО В ВОЗРАСТЕ (ЛЕТ)**

- А) 3-15
- Б) 2-12
- В) 6-12
- Г) 9-15

**210. [T002272] ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР-СПЕЦИФИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ**

- А) кариеса зубов
- Б) эрозии эмали
- В) флюороза зубов
- Г) гипоплазии эмали

**211. [T002273] ЭКЗОГЕННЫМ МЕТОДОМ ФТОРИДПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) чистка зубов фторидсодержащими пастами
- Б) употребление фторированной питьевой воды
- В) употребление фторированного молока
- Г) прием таблеток фторида натрия

**212. [T002274] ЭКЗОГЕННЫМ МЕТОДОМ ФТОРИДПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) полоскания фторидсодержащими растворами
- Б) употребление фторированой питьевой воды
- В) употребление фторированого молока
- Г) прием таблеток фторида натрия

**213. [T002275] ЭНДОГЕННЫМ МЕТОДОМ ФТОРИДПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) употребление фторированого молока
- Б) применение фторидсодержащих зубных паст
- В) покрытие зубов фторидсодержащим лаком
- Г) полоскания фторидсодержащими растворами

**214. [T002276] ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ЭНДОГЕННОГО МЕТОДА ВВЕДЕНИЯ ФТОРИДА В ОРГАНИЗМ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) низкое содержание фторидов в питьевой воде, высокая заболеваемость кариесом среди населения
- Б) низкое содержание фторидов в питьевой воде, низкая заболеваемость кариесом среди населения
- В) высокое содержание фторидов в питьевой воде, высокая заболеваемость кариесом среди населения
- Г) высокое содержание фторидов в питьевой воде, низкая заболеваемость кариесом среди населения

**215. [T002277] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМНЫХ МЕТОДОВ ФТОРИДПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ ФТОРИДА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ**

- А) менее половины оптимального
- Б) оптимальное
- В) предельно-допустимое
- Г) высокое

**216. [T002278] ПОЛОСКАНИЯ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИМИ РАСТВОРАМИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА РЕКОМЕНДУЮТ ПРОВОДИТЬ С ВОЗРАСТА (ЛЕТ)**

- А) 6
- Б) 3
- В) 9
- Г) 12

**217. [T002279] ИНВАЗИВНАЯ МЕТОДИКА ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЗУБОВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

- А) расширение и углубление фиссуры в пределах эмали
- Б) расширение и углубление фиссуры в пределах дентина
- В) формирование полости по I классу
- Г) нанесение герметика без препарирования твердых тканей

**218. [T002281] ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА – МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ**

- А) кариеса зубов
- Б) флюороза зубов
- В) гипоплазии эмали
- Г) эрозии эмали

**219. [T002282] КОМПЛЕКС МЕР, ПРОВОДИМЫХ У БЕРЕМЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ У ПЛОДА И, В ДАЛЬНЕЙШЕМ, У РЕБЕНКА ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА – ЭТО**

- А) антенатальная профилактика стоматологических заболеваний
- Б) постнатальная профилактика стоматологических заболеваний
- В) стоматологическое просвещение
- Г) профессиональная гигиена полости рта

**220. [T002283] ОБЩИЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – ЭТО**

- А) стоматологическое просвещение
- Б) контролируемая чистка зубов
- В) профессиональная гигиена полости рта
- Г) герметизация фиссур зубов

**221. [T002284] ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАРИЕСРЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭМАЛИ ЗУБОВ У ПАЦИЕНТА НАЗНАЧАЮТ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА**

- А) витафтор
- Б) фитин
- В) метилурацил
- Г) лактат или глюконат кальция

**222. [T002285] ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ К ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР**

- А) глубокие интактные фиссуры, минимальный срок с момента прорезывания зуба, незаконченная минерализация жевательной поверхности зуба
- Б) фиссура любого типа, минимальный срок с момента прорезывания зуба, незаконченная минерализация жевательной поверхности зуба
- В) глубокая фиссура, плохая гигиена полости рта, множественный кариес зубов
- Г) все ответы правильные

**223. [T002286] ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ГЕРМЕТИЗАЦИИ**

- А) плохая гигиена полости рта
- Б) наличие узких глубоких фиссур
- В) незаконченная минерализация жевательной поверхности зуба
- Г) отсутствие фиссурного кариеса

**224. [T002287] СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗМ АМИНОКИСЛОТ (АРГИНИН, ЛИЗИН, ПРОЛИН, ТИРОЗИН), ЖИРОВ В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ – ЭТО ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА**

- А) эндогенная безлекарственная
- Б) экзогенная безлекарственная
- В) эндогенная лекарственная
- Г) экзогенная лекарственная

**225. [T002288] НАЗНАЧЕНИЕ ВИТАМИНА Д, РЫБЬЕГО ЖИРА, ПОЛИВИТАМИНОВ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, ПРЕПАРАТОВ ФТОРА, ФИТИНА, МЕТИОНИНА – ЭТО ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА**

- А) эндогенная лекарственная
- Б) эндогенная безлекарственная
- В) экзогенная безлекарственная
- Г) экзогенная лекарственная

**226. [T002289] ИНТЕНСИВНОЕ ЖЕВАНИЕ ЖЕСТКОЙ ПИЩИ, ОГРАНИЧЕНИЕ УГЛЕВОДОВ, ПРИМЕНЕНИЕ САХАРОЗАМЕНИТЕЛЕЙ, РАЦИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА, ПРИМЕНЕНИЕ КАЛЬЦИЙ- И ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ЗУБНЫХ ПАСТ – ЭТО ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА**

- А) экзогенная безлекарственная
- Б) эндогенная безлекарственная
- В) экзогенная лекарственная
- Г) эндогенная лекарственная

**227. [T002290] МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕМОСРЕДСТВ В ВИДЕ АППЛИКАЦИЙ НА ТВЕРДЫЕ ТКАНИ ЗУБОВ, ПОЛОСКАНИЙ, ВАННОЧЕК, ЭЛЕКТРОФОРЕЗА, ВТИРАНИЙ – ЭТО ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА**

- А) экзогенная лекарственная
- Б) экзогенная безлекарственная
- В) эндогенная безлекарственная
- Г) эндогенная лекарственная

**228. [T002291] КОМПЛЕКС ОБЩИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТОМ, ОБЩИМ СОСТОЯНИЕМ, УЧЕТОМ ЕГО НАКЛОННОСТЕЙ -ЭТО ПРОФИЛАКТИКА**

- А) первичная
- Б) вторичная
- В) групповая
- Г) третичная

**229. [T002292] КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ПОЯВЛЕНИЕ РЕЦИДИВОВ БОЛЕЗНИ ПОСЛЕ ЕЕ ЛЕЧЕНИЯ – ЭТО ПРОФИЛАКТИКА**

- А) вторичная
- Б) третичная
- В) групповая
- Г) первичная

**230. [T002293] КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРИ ФУНКЦИИ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ – ЭТО ПРОФИЛАКТИКА**

- А) третичная
- Б) вторичная
- В) групповая
- Г) первичная

**231. [T002294] ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА ФТОРА**

- А) выпадение волос, ухудшение состояния зубов
- Б) ухудшение состояния кожи
- В) общая слабость, рвота
- Г) появление на эмали меловидных пятен, хрупкость зубов

**232. [T002295] ДИЕТА Б НАЗНАЧАЕТСЯ В РЕГИОНАХ**

- А) с оптимальным содержанием фтора в воде
- Б) с повышенным содержанием фтора в воде
- В) с минимальным содержанием фтора в воде
- Г) не имеет значение содержание фтора

**233. [T002296] ПРОДУКТЫ С НАИБОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА**

- А) зеленый чай
- Б) рыба
- В) морская капуста
- Г) орехи

**234. [T002297] ДЛЯ РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКЕ ЛЕУС-БОРОВСКОГО ПРИМЕНЯЮТ**

- А) 10% р-р глюконата кальция, 1-2% р-р фторида натрия
- Б) 5% р-р глюконата кальция, 1-2% р-р фторида натрия
- В) 5% р-р глюконата кальция, 0,1-0,2% р-р фторида натрия
- Г) 10% р-р глюконата кальция, 0,1-0,2% р-р фторида натрия

**235. [T002298] ДЛЯ ПОЛОСКАНИЙ ПРИМЕНЯЮТ Р-Р ФТОРИДА НАТРИЯ В КОНЦЕНТРАЦИИ**

- А) 0,05-0,1-0,2%
- Б) 0,3-0,2%
- В) 1-2%
- Г) 0,1-1%

**236. [T002300] ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КАРИЕСА В СТАДИИ БЕЛОГО ПЯТНА ПРИМЕНЯЕТ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ**

- А) витальное окрашивание
- Б) температурные пробы
- В) рентгенографию
- Г) зондирование

**237. [T002301] ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВОЙ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОРЫ**

- А) 2% р-р метиленового синего
- Б) эритрозина
- В) Шиллера-Писарева
- Г) фуксина

**238. [T002302] ПРИ КАРИЕСЕ В СТАДИИ БЕЛОГО ПЯТНА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭМАЛИ**

- А) увеличена
- Б) не изменена
- В) резко уменьшена
- Г) уменьшена

**239. [T002303] ПРИ ОЧАГОВОЙ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО БЕЛЫЕ ПЯТНА ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА**

- А) вестибулярной поверхности
- Б) экваторе
- В) всей поверхности коронки
- Г) оральной поверхности

**240. [T002304] ОСНОВНОЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ПАРОДОНТИТА**

- А) гигиена полости рта
- Б) укрепление здоровья
- В) лечение кариозных зубов
- Г) протезирование недостающих зубов

**241. [T002305] ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ**

- А) профилактики кариеса
- Б) лечения кариеса
- В) профилактики пульпита
- Г) лечения пульпита

**242. [T002306] ПРОФИЛАКТИКА ПРИВЫЧКИ ПРОКЛАДЫВАНИЯ ЯЗЫКА МЕЖДУ РЕЗЦАМИ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВОЗМОЖНА С ПОМОЩЬЮ**

- А) преортодонтического миотрейнера
- Б) небного бюгеля
- В) аппарата Pendulum
- Г) пластинки с накусочной площадкой

**243. [T002307] ЭНДОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ**

- А) дистопия и транспозиция
- Б) травма зубов и челюсти
- В) кариес зубов и его последствия
- Г) преждевременная потеря временных зубов

**244. [T002308] ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ВКЛЮЧАЕТ**

- А) профессиональную гигиену полости рта
- Б) фторирование питьевой воды
- В) фторирование молока
- Г) прием таблеток, содержащих фторид

**245. [T002309] АНТЕНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЧИНАЕТСЯ**

- А) на этапе планирования беременности и продолжается до родов
- Б) с 28-й недели беременности и продолжается до родов
- В) с 22-23-й недели беременности и продолжается до родов
- Г) с момента диагностики беременности и продолжается до родов

**246. [T002310] ЭНДОГЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ВКЛЮЧАЕТ**

- А) укрепление здоровья путем лечения общих заболеваний, закаливания
- Б) гигиенический уход за полостью рта, который осуществляется в домашних условиях и в стоматологическом кабинете
- В) уменьшение количества потребляемых углеводов
- Г) применение препаратов фтора и кальция в виде лаков, гелей, аппликаций, полосканий



**247. [T002311] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – ЭТО**

- А) система государственных, социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных мер, направленных на предупреждение стоматологических заболеваний путем устранения причин и условий их возникновения, а также повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей природной, производственной и бытовой среды
- Б) система мероприятий, направленных на реабилитацию стоматологического статуса путем сохранения функциональных возможностей органов и тканей челюстно-лицевой области, в основном, методом замещения
- В) комплекс мероприятий, направленных на предотвращение рецидивов и осложнений заболеваний
- Г) система мероприятий, направленных на лечение стоматологических заболеваний

**248. [T002312] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ НАЧИНАЕТСЯ С**

- А) начала периода минерализации зачатков
- Б) момента прорезывания 1 зуба
- В) момента рождения ребенка
- Г) момента прорезывания 5.2, 5.1, 6.1, 6.2

**249. [T002313] СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПОВЫШЕННОГО СТИРАНИЯ ЗУБОВ ВКЛЮЧАЕТ**

- А) своевременное зубное протезирование
- Б) ежедневную чистку зубов жесткой зубной щеткой
- В) использование отбеливающих капп
- Г) проведение аллергических проб перед протезированием

**250. [T002314] ПРОФИЛАКТИКОЙ ФЛЮОРОЗА В ЭНДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) замена водоисточника
- Б) предупреждение заболеваний матери в период беременности
- В) гигиена полости рта
- Г) герметизация фиссур

**251. [T002315] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА СПОСОБСТВУЕТ**

- А) рациональная гигиена полости рта
- Б) покрытие зубов фторидсодержащим лаком
- В) реминерализирующая терапия
- Г) герметизация фиссур

**252. [T002316] АНКЕТА ПЕРВИЧНОГО ПАЦИЕНТА С ЕГО ПОДПИСЬЮ ДОЛЖНА ЗАПОЛНЯТЬСЯ**

- А) в начале приёма
- Б) во время лечения
- В) заполняется по желанию
- Г) на следующий день после приема

**253. [T002317] КАРТОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМА**

- А) № 043 – У
- Б) № 072
- В) № 068 – У
- Г) № 22 – У

**254. [T002318] КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАПОЛНЯЕТ ПАЦИЕНТ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ПОСЕЩЕНИИ**

- А) информированное согласие, согласие на обработку персональных данных
- Б) паспортные данные
- В) карту стоматологического пациента
- Г) карту терапевтического пациента

**255. [T002319] В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС) ВХОДЯТ**

- А) перечень видов и объемов гарантированных медицинских услуг, осуществляемых за счет средств ОМС
- Б) стоимость различных видов медицинской помощи
- В) виды платных медицинских услуг
- Г) организация добровольного медицинского страхования

**256. [T002320] ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ДОПУСКА К МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- А) диплом об окончании высшего или среднего медицинского заведения
- Б) лицензия
- В) свидетельство об окончании курсов
- Г) запись в трудовой книжке

**257. [T002321] ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ГИГИЕНИСТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО**

- А) 5 лет
- Б) 1 год
- В) 3 года
- Г) 10 лет

**258. [T002322] К УЧЕТНОЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- А) медицинская карта стоматологического пациента
- Б) форма № 3 ДОЗ
- В) форма № 2 ДМ
- Г) анкета о состоянии здоровья пациента

**259. [T002323] К ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- А) форма № 3 ДОЗ
- Б) медицинская карта стационарного пациента
- В) медицинская карта стоматологического пациента
- Г) индивидуальная карта донора ооцитов

**260. [T002324] К МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- А) медицинская карта стоматологического пациента
- Б) личные дела медицинских работников
- В) учредительные документы медицинской организации
- Г) трудовые договоры медицинских работников

**261. [T002325] К МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- А) журнал работы воздушного стерилизатора
- Б) личные дела медицинских работников
- В) анкета о состоянии здоровья пациента
- Г) учредительные документы медицинской организации

**262. [T002326] МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПОЛНЯЮЩАЯСЯ В РЕГИСТРАТУРЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ**

- А) медицинская карта форма № 043 – У, паспортная часть
- Б) журнал работы воздушного стерилизатора
- В) учредительные документы медицинской организации
- Г) трудовые договоры медицинских работников

**263. [T002327] ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ**

- А) журнал предстерилизационной обработки, журнал воздушной стерилизации
- Б) журнал работы бактерицидной установки, журнал воздушной стерилизации
- В) журнал генеральной уборки, журнал предстерилизационной обработки
- Г) журнал очистки наконечников, журнал работы скейлеров

**264. [T002329] РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА В ПОЛИКЛИНИКЕ ГИГИЕНИСТ ДОЛЖЕН ВНЕСТИ**

- А) в амбулаторную карту стоматологического больного
- Б) в журнал учёта выдачи листов временной нетрудоспособности
- В) в лист ежедневного учёта работы врача
- Г) в историю болезни больного

**265. [T002330] ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УЧЕТА САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ**

- А) журнал генеральной уборки, журнал работы бактерицидной установки
- Б) журнал учёта выдачи листов временной нетрудоспособности
- В) журнал очистки наконечников, журнал работы скейлеров
- Г) журнал предстерилизационной обработки, журнал воздушной стерилизации

**266. [T002331] В ЖУРНАЛЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРИ НАЛИЧИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАПИСЬ**

- А) ежедневно
- Б) 1 раз в 3 дня
- В) 1 раз в 2 недели
- Г) 1 раз в месяц

**267. [T002333] УСЛОВНАЯ ЕДИНИЦА ТРУДОЕМКОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ**

- А) объем работы, выполненной при среднем кариесе
- Б) объем работы, выполненной при глубоком кариесе зубов
- В) качество стоматологической работы
- Г) стоматологическую заболеваемость

**268. [T002334] СОГЛАСИЕ ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА НА ЛЕЧЕБНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО**

- А) обязательно получать в любом случае
- Б) необязательно
- В) необязательно, если пациент страдает психическим заболеванием
- Г) необязательно, если имеется угроза его жизни

**269. [T002335] МЕЖДУНАРОДНАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ**

- А) 18 17 16 15 14 13 12 11|21 22 23 24 25 26 27 28chr(13)48 47 46 45 44 43 42 41|31 32 33 34 35 36 37 38
- Б) 55 54 53 52 51|61 62 63 64 65chr(13)85 84 83 82 81|71 72 73 74 75
- В) 51 52 53 54 55|65 64 63 62 61chr(13)85 84 83 82 81|71 72 73 74 75
- Г) 65 64 63 62 61|61 62 63 64 65chr(13)75 84 83 82 81|71 72 73 74 75

**270. [T002336] МЕЖДУНАРОДНАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ**

- А) 55 54 53 52 51|61 62 63 64 65chr(13)85 84 83 82 81|71 72 73 74 75
- Б) 18 17 16 15 14 13 12 11|21 22 23 24 25 26 27 28chr(13)48 47 46 45 44 43 42 41|31 32 33 34 35 36 37 38
- В) 51 52 53 54 55|65 64 63 62 61chr(13)85 84 83 82 81|71 72 73 74 75
- Г) 65 64 63 62 61|61 62 63 64 65chr(13)75 84 83 82 81|71 72 73 74 75

**271. [T002337] ГРАФИКО-ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ**

А) 8 7 6 5 4 3 2 1|1 2 3 4 5 6 7 8chr(13)8 7 6 5 4 3 2 1|1 2 3 4 5 6 7 8

Б) V IV III II I|I II III IV Vchr(13)V IV III II I|I II III IV V

В) 51 52 53 54 55|65 64 63 62 61chr(13)85 84 83 82 81|71 72 73 74 75

Г) 65 64 63 62 61|61 62 63 64 65chr(13)75 84 83 82 81|71 72 73 74 75

**272. [T002338] ГРАФИКО-ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ**

А) V IV III II I|I II III IV Vchr(13)V IV III II I|I II III IV V

Б) 8 7 6 5 4 3 2 1|1 2 3 4 5 6 7 8chr(13)8 7 6 5 4 3 2 1|1 2 3 4 5 6 7 8

В) 51 52 53 54 55|65 64 63 62 61chr(13)85 84 83 82 81|71 72 73 74 75

Г) 65 64 63 62 61|61 62 63 64 65chr(13)75 84 83 82 81|71 72 73 74 75

**273. [T002339] В ЗУБНОЙ ФОРМУЛЕ КОРЕНЬ РАЗРУШЕННОГО ЗУБА ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИМВОЛОМ**

А) R

Б) K

В) X

Г) Ks

**274. [T002340] В ЗУБНОЙ ФОРМУЛЕ ПЕРИОДОНТИТ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИМВОЛОМ**

А) Pt

Б) П

В) X

Г) P

**275. [T002341] ПУЛЬПИТ МОЛОЧНОГО ЗУБА В ЗУБНОЙ ФОРМУЛЕ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИМВОЛОМ**

А) P

Б) R

В) Pt

Г) П

**276. [T002342] КАРИЕС МОЛОЧНОГО ЗУБА В ЗУБНОЙ ФОРМУЛЕ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИМВОЛОМ**

- А) С
- Б) Ks
- В) Км
- Г) Ка

**277. [T002343] УДАЛЁННЫЙ ЗУБ В ЗУБНОЙ ФОРМУЛЕ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИМВОЛОМ**

- А) 0
- Б) R
- В) S
- Г) У

**278. [T002344] ОТСУТСТВУЮЩИЙ ЗУБ У ВЗРОСЛОГО В ЗУБНОЙ ФОРМУЛЕ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИМВОЛОМ**

- А) 0
- Б) X
- В) R
- Г) У

**279. [T002345] ПЛОМБА В ЗУБНОЙ ФОРМУЛЕ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СИМВОЛОМ**

- А) П
- Б) Pt
- В) Пл
- Г) Р

**280. [T002346] КАРИОЗНЫЕ ПОЛОСТИ НА КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ РЕЗЦОВ И КЛЫКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ РЕЖУЩЕГО КРАЯ - ЭТО ПО КЛАССИФИКАЦИИ БЛЕКА**

- А) 4 класс
- Б) 3 класс
- В) 2 класс
- Г) 1 класс

**281. [T002347] КАРИОЗНЫЕ ПОЛОСТИ НА КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ МОЛЯРОВ И ПРЕМОЛЯРОВ - ЭТО ПО КЛАССИФИКАЦИИ БЛЕКА**

- А) 2 класс
- Б) 1 класс
- В) 3 класс
- Г) 4 класс

**282. [T002348] КАРИОЗНЫЕ ПОЛОСТИ НА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МОЛЯРОВ, ПРЕМОЛЯРОВ, СЛЕПЫХ ЯМКАХ -ЭТО ПО КЛАССИФИКАЦИИ БЛЕКА**

- А) 1 класс
- Б) 2 класс
- В) 3 класс
- Г) 5 класс

**283. [T002349] КАРИОЗНЫЕ ПОЛОСТИ В ПРИШЕЕЧНОЙ ОБЛАСТИ ВСЕХ ГРУПП ЗУБОВ - ЭТО ПО КЛАССИФИКАЦИИ БЛЕКА**

- А) 5 класс
- Б) 4 класс
- В) 3 класс
- Г) 1 класс

**284. [T002350] СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ СОГЛАСИЕ, ЛИБО НЕСОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА**

- А) обязательна
- Б) с медицинским назначением
- В) применяется для некоторых видов медицинского вмешательства
- Г) не предусмотрена

**285. [T002351] МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО - ЭТО УСТАНОВЛЕННАЯ ЗАКОНОМ ФОРМА**

- А) № 043/у
- Б) № 237/у
- В) № 086/у
- Г) № 067/у



**286. [T002352] СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ**

- А) в письменной форме
- Б) в форме гражданско-правового договора
- В) в нотариальной форме
- Г) на основании судебного решения

**287. [T002353] ОСНОВНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА В ПОЛИКЛИНИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) медицинская карта стоматологического больного (формы №043/у)
- Б) листок ежедневного учета работы врача-стоматолога (зубного врача) стоматологической поликлиники, отделения, кабинета (форма №037/у-88)
- В) контрольная карта диспансерного наблюдения (форма №030/у)
- Г) журнал учета профилактических осмотров полости рта (форма №049/у)

**288. [T002354] ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ПОЛОСТИ РТА (ФОРМА №049/У) ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ**

- А) регистрации профилактических осмотров
- Б) планирования времени работы
- В) контроля качества
- Г) отчета перед ФОМС

**289. [T002355] КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ПОЛОСТИ РТА (ФОРМА №049/У) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- А) заведующий отделением
- Б) главный врач медицинской организации
- В) регистратор
- Г) статистик

**290. [T002356] ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом отравлении, профессиональном заболевании
- Б) журнал регистрации инфекционных заболеваний медицинской организации
- В) отчет ежемесячный и годовой о числе инфекционных заболеваний
- Г) отчет о заболеваниях активным туберкулезом

**291. [Т002357] МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО (ФОРМА №043/У) ОФОРМЛЯЕТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЦИЕНТА**

- А) при первичном обращении
- Б) при каждом обращении
- В) один раз в год
- Г) один раз в пять лет

**292. [Т002358] ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО (ФОРМА №043/У) ЗАПОЛНЯЕТСЯ**

- А) медицинским регистратором
- Б) врачом-стоматологом
- В) врачом-статистиком
- Г) медсестрой

**293. [Т002359] «КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНОГО» (Ф. №030/У) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ**

- А) учетным
- Б) юридическим
- В) диагностическим
- Г) отчетным

**294. [Т002360] ПРИ ВЗЯТИИ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ ПАЦИЕНТА ГИГИЕНИСТ ДОЛЖЕН ОФОРМИТЬ**

- А) контрольную карту диспансерного наблюдения (форма №030/у), медицинскую карту стоматологического больного (форма №043/у)
- Б) листок ежедневного учета работы врача-стоматолога (зубного врача) стоматологической поликлиники, отделения, кабинета (форма 037/у-88)
- В) направление на консультацию и во вспомогательные кабинеты (форма 028/у)
- Г) медицинскую карту стационарного больного (форма 003/у)

**295. [Т002361] ДИАГНОЗ И ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО (ФОРМА №043/У) ЗАПОЛНЯЮТСЯ**

- А) лечащим врачом
- Б) медсестрой
- В) регистратором
- Г) заведующим отделением

**296. [T002362] ПРИ ХРАНЕНИИ НА СТЕРИЛЬНОМ СТОЛЕ, ИНСТРУМЕНТЫ СОХРАНЯЮТ СТЕРИЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕНИИ (ЧАСОВ)**

- А) 6
- Б) 7
- В) 8
- Г) 9

**297. [T002363] СРОК ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ В КОМБИНИРОВАННЫХ (ЛАМИНАТ + БУМАГА) ПРОЗРАЧНЫХ ПАКЕТАХ, ЗАКРЫТЫХ ТЕРМОСШИВАТЕЛЯМИ, СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 1 год
- Б) 3 месяца
- В) 6 месяцев
- Г) 9 месяцев

**298. [T002364] ВРЕМЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ БОРОВ И ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ГЛАСПЕРЛЕНОВОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ**

- А) 20 секунд
- Б) 5 секунд
- В) 60 секунд
- Г) 120 секунд

**299. [T002365] ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ ИСХОДНЫЙ РАСТВОР АЗОПИРАМА СМЕШИВАЮТ С РАВНЫМ ПО ОБЪЕМУ РАСТВОРОМ**

- А) перекиси водорода 3%
- Б) йода 5%
- В) физраствором
- Г) уксусной кислоты 30%

**300. [T002366] ДОПУСТИМЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ИСХОДНОГО РАСТВОРА АЗОПИРАМА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ**

- А) 2 месяца
- Б) 1 месяц
- В) 4 месяца
- Г) 5 месяцев

**301. [T002367] НАЛИЧИЕ НА ИНСТРУМЕНТАХ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ЩЕЛОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОПРЕДЕЛЯЮТ**

- А) постановкой фенолфталеиновой пробы
- Б) постановкой амидопириновой пробы
- В) постановкой пробы с суданом
- Г) постановкой азопирамовой пробы

**302. [T002368] РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ОТДЕЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ, ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ (КВ.М)**

- А) 6
- Б) 8
- В) 9
- Г) 11

**303. [T002369] ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРИ НАЛИЧИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

- А) ежедневно
- Б) 1 раз в 3 дня
- В) 1 раз в 2 недели
- Г) 1 раз в месяц

**304. [T002370] СМЫВЫ ПРОВОДЯТСЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА**

- А) дезинфекции
- Б) стерилизации
- В) утилизации
- Г) предстерилизационной очистки

**305. [T002371] МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ И ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЕЗИНЫ, ЛАТЕКСА, ХИРУРГИЧЕСКОГО БЕЛЬЯ**

- А) паровым
- Б) биологическим
- В) воздушным
- Г) химическим

**306. [T002372] МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ В АВТОКЛАВЕ**

- А) паровой
- Б) химический
- В) биологический
- Г) воздушный

**307. [T002373] МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗЕРКАЛ**

- А) паровой
- Б) воздушный
- В) биологический
- Г) гласперленовый

**308. [T002374] ВТОРЫМ ЭТАПОМ ОБРАБОТКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) предстерилизационная очистка
- Б) утилизация
- В) санитарная обработка
- Г) стерилизация

**309. [T002375] ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ОБРАБОТКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) дезинфекция
- Б) стерилизация
- В) предстерилизационная очистка
- Г) утилизация

**310. [T002376] ДЕКОНТАМИНАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЭТАПЫ**

- А) дезинфекцию, предстерилизационную очистку, стерилизацию
- Б) предстерилизационную очистку, стерилизацию
- В) дезинфекцию, стерилизацию, утилизацию отходов
- Г) дезинфекцию

**311. [T002377] ПОСЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ИМЕЛ МЕСТО КОНТАКТ РУК С ХЛОРНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, КОЖУ ОБРАБАТЫВАЮТ ВАТНЫМ ТАМПОНОМ, СМОЧЕННЫМ РАСТВОРОМ**

- А) 1% гипосульфита натрия
- Б) 2% перекиси водорода
- В) 0,05% хлоргексидина
- Г) 70% медицинского спирта

**312. [T002378] ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСОМ ГРИППА ПРОИСХОДИТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПУТЕМ**

- А) воздушно-капельным
- Б) фекально-оральным
- В) кишечным
- Г) контактно-бытовым

**313. [T002379] ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЁТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ**

- А) гепатит А
- Б) гепатит В
- В) острое респираторное заболевание
- Г) простой герпес

**314. [T002380] УДАЛЕНИЕ С ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЛКОВЫХ, ЖИРОВЫХ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ, МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, КРОВИ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

- А) предстерилизационная очистка
- Б) дезинфекция
- В) утилизация
- Г) стерилизация

**315. [T002381] УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЕХ ФОРМ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВКЛЮЧАЯ ВЕГЕТАТИВНЫЕ И СПОРОВЫЕ ФОРМЫ - ЭТО**

- А) стерилизация
- Б) контаминация
- В) утилизация
- Г) дезинфекция

**316. [T002382] УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫСОКОРЕЗИСТЕНТНЫХ СПОРОВЫХ ФОРМ - ЭТО**

- А) дезинфекция
- Б) стерилизация
- В) контаминация
- Г) утилизация

**317. [T002383] ПАКЕТ СО СТЕРИЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ОСМОТРА ПАЦИЕНТА ВСКРЫВАЮТ**

- А) во время приёма, на глазах у пациента
- Б) до начала приёма, в стерилизационной
- В) за 2 часа до приема пациента
- Г) за 1 час до приема пациента

**318. [T002384] АБСОЛЮТНОЙ СУХОСТИ РАБОЧЕГО ПОЛЯ ПРИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЯХ В ПОЛОСТИ РТА МОЖНО ДОСТИЧЬ, ИСПОЛЬЗУЯ**

- А) коффердам, слюноотсос, пылесос
- Б) ватные валики, пылесос
- В) слюноотсос, пылесос
- Г) ватные валики, слюноотсос

**319. [T002386] ДЛЯ ПОЛНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЖИДКОСТИ И МИКРОЧАСТИЦ МАТЕРИАЛА ИЗ ПОЛОСТИ РТА ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

- А) слюноотсос и пылесос
- Б) коффердам
- В) бумажные салфетки
- Г) марлевые тампоны

**320. [T002387] БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ ОТКРЫТОГО ТИПА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ**

- А) при отсутствии людей в помещении
- Б) во время нахождения там людей
- В) во время нахождения там людей в медицинской одежде
- Г) наличие или отсутствие людей значения не имеет

**321. [T002388] БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ ЗАКРЫТОГО ТИПА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ**

- А) наличие или отсутствие людей значения не имеет
- Б) только при отсутствии людей в помещении
- В) только во время нахождения там людей в медицинской одежде
- Г) только во время нахождения там медицинской сестры

**322. [T002389] ПАКЕТЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА «Б» ИМЕЮТ**

- А) желтую маркировку
- Б) красную маркировку
- В) белую маркировку
- Г) черную маркировку

**323. [T002390] СУХОЖАРОВАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ**

- А) цельнометаллических инструментов
- Б) шовного материала
- В) ватных валиков
- Г) перевязочного материала

**324. [T002391] ГЛАСПЕРЛЕНОВЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ**

- А) боры, эндодонтический инструментарий
- Б) стоматологические зеркала
- В) оттиски
- Г) ватные валики

**325. [T002392] ПОВЕРХНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ РАСТВОРОМ**

- А) после приема каждого пациента
- Б) один раз в день
- В) два раза в день
- Г) три раза в день



**326. [T002393] МЕТОД УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ОДНОРАЗОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ (ШПРИЦЫ И ДР.)**

- А) Поместить в дезинфицирующий раствор в не прокалываемом контейнере выдержать экспозицию, затем привести в негодность, в мусор
- Б) Удалить вместе с бытовым мусором
- В) Прокипятить и отправить в контейнер для мусора
- Г) Залить на 1 час раствором дезинфицирующим раствором, затем – в бытовой мусор

**327. [T002394] МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ КОНТАКТ С КРОВЬЮ И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ НА HBS AG ОБСЛЕДУЮТ**

- А) 1 раз в год
- Б) 1 раз в 2 года
- В) при увольнении с работы
- Г) Ежеквартально

**328. [T002395] КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОХРАНЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ**

- А) профилактика
- Б) антисептика
- В) дезактивация
- Г) дезинфекция

**329. [T002396] ОСНОВНЫМ БАРЬЕРНЫМ СРЕДСТВОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) маска
- Б) фартук
- В) одноразовые перчатки
- Г) шапочка

**330. [T002397] ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ОДИН РАЗ В**

- А) неделю
- Б) день
- В) 3 дня
- Г) месяц

**331. [T002398] МАСКУ, КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, СЛЕДУЕТ НОСИТЬ НЕПРЕРЫВНО В ТЕЧЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ (ЧАСОВ)**

- А) 2
- Б) 1
- В) 4
- Г) 3

**332. [T002399] ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ РУК КРОВЬЮ ИХ СЛЕДУЕТ**

- А) обработать немедленно тампоном, смоченным кожным антисептиком, двукратно вымыть руки теплой проточной водой с мылом и насухо вытереть салфеткой
- Б) обработать тампоном, смоченным кожным антисептиком
- В) обработать немедленно тампоном, смоченным кожным антисептиком, двукратно вымыть руки теплой проточной водой с мылом и насухо вытереть салфеткой, повторить через 2 часа данную процедуру
- Г) двукратно вымыть руки теплой проточной водой с мылом и насухо вытереть салфеткой

**333. [T002400] КОМПЛЕКС МЕР, ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОПАДАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ В РАНУ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ, ЭТО**

- А) асептика
- Б) антисептика
- В) дезинфекция
- Г) стерилизация

**334. [T002401] КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ И УНИЧТОЖЕНИЮ ПОПАВШЕЙ В РАНУ ИНФЕКЦИИ - ЭТО**

- А) антисептика
- Б) асептика
- В) дезинфекция
- Г) стерилизация

**335. [T002402] МЕТОД ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОСМОТРА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ**

- А) дезинфекция, предстерилизационная очистка, высокотемпературная стерилизация
- Б) предстерилизационная очистка, дезинфекция одним из дезрастворов
- В) протирание стерильным ватно-марлевым тампоном, смоченным дезраствором
- Г) не проводится обработка

**336. [T002403] ОСНОВНОЙ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ СВЕТОВОДОВ ЛАМПЫ ДЛЯ СВЕТОТВЕРЖДАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ**

- А) паровой
- Б) воздушный
- В) химический
- Г) гласперленовый

**337. [T002404] ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА УНИЧТОЖАЕТСЯ:**

- А) при нагревании до 56 градусов Цельсия в течении 30 минут, 70% раствором спирта или кипячением в течение 1 минуты
- Б) при высушивании, при облучении в течение 3 суток
- В) при воздействии рентген-лучами, 1% раствором перекиси водорода
- Г) при промывании проточной водой

**338. [T002405] ДЕЗИНФЕКЦИЯ - ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ**

- А) всех микроорганизмов
- Б) только бактерий
- В) анаэробных бактерий
- Г) аэробных бактерий

**339. [T002406] ГЛАСПЕРЛЕНОВЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ**

- А) мелкого инструментария (тары, к примеру)
- Б) наконечников
- В) зеркал
- Г) любого инструментария

**340. [T002407] КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОВОДЯТ ПЛАНОВО**

- А) 1 раз в 3 года
- Б) 2 раза в год
- В) 1 раз в год
- Г) по эпидемпоказаниям

**341. [T002408] САМОКОНТРОЛЬ (КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ) В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ ПРОВОДЯТ**

- А) не реже 1 раза в неделю
- Б) ежедневно
- В) 1 раз в месяц
- Г) 1 раз в 6 месяцев

**342. [T002409] КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ**

- А) до проведения стерилизации
- Б) после проведения стерилизации
- В) при проведении генеральной уборки
- Г) по требованию пациента

**343. [T002410] ЧТО ВЫЯВЛЯЕТ АЗОПИРАМОВАЯ ПРОБА**

- А) следы крови
- Б) следы моющего вещества
- В) следы ржавчины
- Г) следы жира

**344. [T002411] ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ ВОЗНИКАЕТ**

- А) фиолетовое окрашивание переходящее в розово-сиреневое и буроватое
- Б) фиолетовое окрашивание переходящее в зеленое
- В) фиолетовое окрашивание переходящее в ярко красное
- Г) фиолетовое окрашивание переходящее в темно синее

**345. [T002412] КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ ПОДЛЕЖИТ \_\_\_% ИЗДЕЛИЙ КАЖДОГО НАИМЕНОВАНИЯ, ОБРАБОТАННЫХ В СМЕНУ**

- А) 1
- Б) 10
- В) 2
- Г) 5

**346. [T002413] ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕД УТИЛИЗАЦИЕЙ**

- А) дезинфицируют
- Б) стерилизуют
- В) протирают спиртом
- Г) промывают водой

**347. [T002414] СОВРЕМЕННЫЕ ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ**

- А) светотвердеющие материалы
- Б) цинкофосфатные цементы
- В) силикофосфатные
- Г) фосфатные

**348. [T002415] ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ПЕРЕД УТИЛИЗАЦИЕЙ**

- А) дезинфицируют
- Б) разрезают
- В) автоклавируют
- Г) моют

**349. [T002416] УПАКОВКА И КОЛПАЧОК ИГЛЫ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ОДНОРАЗОВОГО ШПРИЦА – ЭТО МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА**

- А) «А»
- Б) «Б»
- В) «В»
- Г) «Г»

**350. [T002417] СРОК ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОГО НЕУПАКОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА В КВАРЦЕВОЙ КАМЕРЕ**

- А) 1 неделя
- Б) 6 часов
- В) 24 часа
- Г) 2 недели

**351. [T002418] ДЛЯ ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ ФИССУР ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ**

- А) силанты
- Б) силикатные цементы
- В) эвикрол
- Г) цинк-фосфатные цементы

**352. [T002419] ШПАТЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ**

- А) растирания и замешивания пломбировочных материалов
- Б) удаления избытков пломбировочного материала из кариозной полости
- В) уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости
- Г) удержания мягких тканей полости рта

**353. [T002420] СТЕРИЛЬНЫЙ СТОЛ, НАКРЫТЫЙ СТЕРИЛЬНОЙ ПРОСТЫНЬЮ, ОСТАЕТСЯ СТЕРИЛЬНЫМ**

- А) 6 часов
- Б) 24 часа
- В) 12 часов
- Г) 48 часов

**354. [T002421] ОСТРЫЙ МЕЛКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАБАТЫВАЮТ, ПОМЕЩАЯ В**

- А) жесткий (пластмассовый) контейнер желтого цвета
- Б) полиэтиленовый пакет желтого цвета
- В) контейнер для дезинфекции белого цвета
- Г) плевательницу

**355. [T002422] ОСТРЫЙ МЕЛКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕД УТИЛИЗАЦИЕЙ ПОМЕЩАЮТ В**

- А) жесткий (пластмассовый) контейнер желтого цвета
- Б) полиэтиленовый пакет желтого цвета
- В) контейнер для дезинфекции белого цвета
- Г) плевательницу

**356. [T002423] ДЕЗИНФЕКЦИЮ ВОЗДУХА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРИ ПОМОЩИ**

- А) кварцевых ламп открытого типа
- Б) протирания поверхностей дезинфектантами
- В) автоклавирования
- Г) использования гласперленового стерилизатора

**357. [T002424] ПРОБА НА НАЛИЧИЕ ОСТАТКОВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ:**

- А) фенолфталеиновая
- Б) азопирамовая
- В) хлорводородная
- Г) йодная

**358. [T002425] ВРЕМЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ СУХИМ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 180 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ СОСТАВЛЯЕТ:**

- А) 60 минут
- Б) 20 минут
- В) 45 минут
- Г) 120 минут

**359. [T002426] РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ АМАЛЬГАМЫ, ДОЛЖНЫ ВЫДАВАТЬСЯ**

- А) хирургические халаты без карманов
- Б) медицинские халаты без воротников
- В) хирургические халаты с карманами
- Г) одноразовые медицинские шапочки

**360. [T002427] ОЧИЩЕНИЕ СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ**

- А) утром в обед и вечером
- Б) вечером
- В) утром
- Г) в очищении нет необходимости

**361. [T002428] ЗАПИСЬ В ЖУРНАЛЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ДЕЛАЕТСЯ**

- А) после проведенного цикла предстерилизационной очистки
- Б) перед циклом предстерилизационной очистки
- В) еженедельно
- Г) до и после проведенного цикла предстерилизационной очистки

**362. [T002429] ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ КВАРЦЕВОЙ КАМЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА**

- А) в неделю
- Б) в сутки
- В) в смену
- Г) в месяц

**363. [T002430] КВАРЦЕВУЮ КАМЕРУ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В НЕДЕЛЮ**

- А) дезинфицировать и стерилизовать
- Б) дезинфицировать однократно
- В) мыть проточной водой
- Г) дезинфицировать двукратно

**364. [T002431] РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ**

- А) 6 месяцев
- Б) 2 недели
- В) 3 месяца
- Г) 1 месяц

**365. [T002432] ДЕЗИНФЕКЦИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ ПРОВОДЯТ ПУТЕМ**

- А) протираания
- Б) кипячения
- В) замачивания в дезрастворе
- Г) промывания под проточной водой



**366. [T002433] ДЕЗИНФЕКЦИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОВОДЯТ ПУТЕМ**

- А) замачивания в дезрастворе
- Б) протирания
- В) кипячения
- Г) промывания под проточной водой

**367. [T002434] ДЕЗИНФЕКЦИЮ МЕЛКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОВОДЯТ ПУТЕМ**

- А) замачивания в дезрастворе
- Б) прокаливания
- В) кипячения
- Г) протирания

**368. [T002435] ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА ДЕЗИНФЕКТАНТА ИЗ ОДНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ НА ДЕЗИНФЕКТАНТ ИЗ ДРУГОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) ротацией
- Б) экспозицией
- В) конвергенцией
- Г) дислокацией

**369. [T002436] СОВМЕЩЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ С ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ВОЗМОЖНО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

- А) специальных растворов
- Б) хлоргексидина
- В) хлорамина
- Г) перекиси водорода

**370. [T002437] НАГРУДНЫЕ САЛФЕТКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА ПОДЛЕЖАТ СМЕНЕ**

- А) После каждого пациента
- Б) После рабочего дня
- В) 1 раз в месяц
- Г) 1 раз в неделю

**371. [T002438] ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРЕДМЕТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ЛЕЧЕНИЯ (СТОЛИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ, КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТИЛЬНИК), ПРОВОДЯТ ПОСЛЕ**

- А) каждого пациента
- Б) замечания руководителя
- В) предписания
- Г) рабочего дня

**372. [T002439] ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОДГОЛОВНИКА И ПОДЛОКОТНИКОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КРЕСЛА ПРОВОДЯТ ПОСЛЕ**

- А) каждого пациента
- Б) замечания руководителя
- В) рабочего дня
- Г) предписания

**373. [T002440] ФУНГИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАПРАВЛЕНО НА УНИЧТОЖЕНИЕ**

- А) грибов
- Б) вирусов
- В) бактерий
- Г) простейших

**374. [T002441] ВИРУЛИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАПРАВЛЕНО НА УНИЧТОЖЕНИЕ**

- А) вирусов
- Б) бактерий
- В) простейших
- Г) грибов

**375. [T002442] БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАПРАВЛЕНО НА УНИЧТОЖЕНИЕ**

- А) бактерий
- Б) вирусов
- В) грибов
- Г) простейших

**376. [T002443] ПЕРЕД НАПРАВЛЕНИЕМ И ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ: СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОТТИСКИ, ЗАГОТОВКИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ**

- А) дезинфицируют
- Б) высушивают
- В) стерилизуют
- Г) протирают

**377. [T002444] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ИМПЛАНТАНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ИНСТРУМЕНТЫ**

- А) пластмассовые
- Б) стальные
- В) металлические
- Г) кобальтохромовые

**378. [T002445] ПОСЛЕ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ И ПРОМЫВАНИЯ ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ, ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОПОЛАСКИВАЮТ**

- А) дистиллированной водой
- Б) перекисью водорода 3%
- В) хлоргексидином 0,005%
- Г) перекисью водорода 6%

**379. [T002446] СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ \_\_\_°С \_\_\_МИН**

- А) 180-60
- Б) 125-45
- В) 160-40
- Г) 80-60

**380. [T002447] МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОЙ (ХОЛОДНОЙ) СТЕРИЛИЗАЦИИ СТЕРИЛИЗУЮТ**

- А) зеркала, изделия из стекла
- Б) наконечники
- В) боры
- Г) одноразовые шприцы

**381. [T002448] В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ СТЕРИЛИЗУЮТСЯ ИНСТРУМЕНТЫ**

- А) пинцет, зонд
- Б) зеркало, пинцет
- В) зонд, шприц
- Г) зеркало, шприц

**382. [T002449] ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА (ГРАДУСОВ)**

- А) 18-23
- Б) 15-16
- В) 17-18
- Г) 23-28

**383. [T002450] АВТОКЛАВИРОВАНИЕМ СТЕРИЛИЗУЮТСЯ**

- А) марлевые тампоны, наконечники
- Б) одноразовые шприцы
- В) пластмассовые шпатели
- Г) слюноотсосы, зеркала

**384. [T002451] ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА «АССИСТИНА» ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) предстерилизационная очистка и смазывание наконечников
- Б) стерилизация наконечников
- В) дезинфекция боров
- Г) дезинфекция эндодонтического инструментария

**385. [T002452] СРЕДСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗЕРКАЛ**

- А) 6% раствор перекиси водорода
- Б) 1% раствор перекиси водорода
- В) 0,5% раствор хлорамина
- Г) 75% метиловый спирт

**386. [T002453] ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОРЫ ПОМЕЩАЮТ В**

- А) дезинфицирующий раствор
- Б) сухожаровой шкаф
- В) глассперленовый стерилизатор
- Г) «Терминатор»

**387. [T002454] СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА СТЕРИЛИЗУЮТСЯ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПО ВРЕМЕНИ (ЧАСОВ)**

А) 1-2

Б) 2-3

В) 3

Г) 4-5

**388. [T002455] В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ПЛОЩАДЬ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ (КВ.М)**

А) 8

Б) 10

В) 20

Г) 25

**389. [T002456] КВАРЦЕВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В ДЕНЬ (КОЛИЧЕСТВО РАЗ)**

А) 3

Б) 1

В) 2

Г) 4

**390. [T002457] РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КРЕСЛАМИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ (М)**

А) 1,5

Б) 1,0

В) 1,2

Г) 2,0

**391. [T002458] В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ СТЕРИЛИЗУЮТСЯ**

А) зонды

Б) стоматологические зеркала

В) одноразовые шприцы

Г) перчатки

**392. [T002459] НА КАЖДОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КРЕСЛО С УНИВЕРСАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПЛОЩАДЬ \_\_\_\_\_ КВ.М**

- А) 10
- Б) 15
- В) 14
- Г) 5

**393. [T002460] ОКНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАНЫ НА НАПРАВЛЕНИЕ**

- А) северное
- Б) южное
- В) западное
- Г) восточное

**394. [T002461] РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КРЕСЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАНО НА**

- А) окно
- Б) двери
- В) стену
- Г) врача

**395. [T002462] АЗОПИРАМОВАЯ ПРОБА ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ**

- А) предстерилизационной очистки
- Б) дезинфекции
- В) стерилизации
- Г) каждого этапа дезинфекции

**396. [T002463] ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТОВ НА НАЛИЧИЕ КРОВИ И БЕЛКОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОБА**

- А) амидопириновая
- Б) йодиоловая
- В) бензидиновая
- Г) фенолфталеиновая

**397. [T002464] ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛЮНООТСОСЫ**

- А) дезинфицируют
- Б) утилизируют
- В) стерилизуют
- Г) промывают

**398. [T002465] ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ С ПОВЕРХНОСТИ ЗУБА УДАЛЯЕТСЯ**

- А) мягкий зубной налет
- Б) поддесневой зубной камень
- В) налет курильщика
- Г) наддесневой зубной камень

**399. [T002466] ВРЕМЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ МАНУАЛЬНОЙ ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ (\_\_\_ МИНУТ)**

- А) 2-3
- Б) 1-1,5
- В) 3,5- 4
- Г) 4,5- 6

**400. [T002467] ЗА ЕЖЕДНЕВНУЮ ЧИСТКУ ЗУБОВ У РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТВЕТСТВЕННЫ**

- А) родители
- Б) стоматолог
- В) гигиенист
- Г) педиатр

**401. [T002468] РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ НАЧИНАТЬ ЧИСТИТЬ ДЕТЯМ ЗУБЫ С ВОЗРАСТА**

- А) прорезывания первого временного зуба
- Б) 1 года
- В) 2 лет
- Г) 3 лет

**402. [T002469] ЗУБНАЯ ЩЕТКА ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ В СРЕДНЕМ 1 РАЗ В**

- А) 2-3 месяца
- Б) неделю
- В) месяц
- Г) 6 месяцев

- 403. [T002470] ХРАНИТЬ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ СЛЕДУЕТ В**
- А) стакане рабочей частью вверх
  - Б) стакане рабочей частью вниз
  - В) футляре
  - Г) дезинфицирующем растворе
- 404. [T002472] РЕБЁНКУ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ОЧИЩАТЬ ЗУБЫ**
- А) 2 раза в день
  - Б) 1 раз вечером
  - В) 1 раз утром
  - Г) 3 раза в день
- 405. [T002473] ПРИ ЧИСТКЕ ЗУБОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ЗУБНОЙ ПАСТЫ РАЗМЕРОМ С**
- А) горошину
  - Б) 1/4 длины щеточного поля
  - В) 1/2 длины щеточного поля
  - Г) 3/4 длины щеточного поля
- 406. [T002474] РАЗМЕР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ (\_\_\_ММ)**
- А) 30
  - Б) 20
  - В) 25
  - Г) 10
- 407. [T002475] МЕТОД ЧИСТКИ ЗУБОВ, ПРИ КОТОРОМ ОЧИЩЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБОВ ПРОИЗВОДИТСЯ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ, НАЗЫВАЕТСЯ**
- А) круговым Fones
  - Б) Leonard
  - В) Stillman
  - Г) стандартным Г.Н.Пахомова



**408. [T002476] ПРИ ОЧИЩЕНИИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ И ОРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБОВ ПРИ СТАНДАРТНОМ МЕТОДЕ ЧИСТКИ ЗУБОВ ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВКИ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ СОВЕРШАЮТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ**

- А) вертикальном (от десны к режущему краю или жевательной поверхности)
- Б) вертикальном (от режущему краю или жевательной поверхности к десне)
- В) горизонтальном (вправо-влево, вперед-назад, параллельно десне)
- Г) головка зубной щетки совершает круговые движения против часовой стрелки

**409. [T002477] МЕТОД ЧИСТКИ ЗУБОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ДЕЛЕНИЕ ЗУБНОГО РЯДА НА СЕГМЕНТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ЗУБОВ КАЖДОГО СЕГМЕНТА, НАЧИНАЯ С ВЕРХНИХ ПРАВЫХ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ, НАЗЫВАЕТСЯ МЕТОДОМ**

- А) стандартным Г.Н.Пахомова
- Б) круговым Fones
- В) Stillman
- Г) Bass

**410. [T002478] КРУГОВОЙ МЕТОД ЧИСТКИ ЗУБОВ FONES РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ**

- А) взрослым и детям
- Б) школьникам
- В) взрослым
- Г) лицам пожилого возраста

**411. [T002479] ИНДИКАТОРНЫЕ ЩЕТИНКИ ИМЕЮТСЯ У ЗУБНЫХ ЩЕТОК ДЛЯ**

- А) определения срока замены щетки
- Б) улучшения эстетического вида
- В) наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
- Г) наиболее эффективного очищения зубов в стадии прорезывания

**412. [T002480] ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ЗУБНЫМ ЩЕТКАМ, ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ**

- А) искусственного волокна
- Б) натуральной щетины
- В) индикаторных щетинок
- Г) прямой ручки

**413. [T002481] СИЛОВОЙ (АКТИВНЫЙ) ВЫСТУП ИМЕЕТСЯ У ЗУБНЫХ ЩЕТОК ДЛЯ**

- А) очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
- Б) наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
- В) определения срока замены щетки
- Г) улучшения эстетического вида щетки

**414. [T002482] ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЗУБОВ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА  
НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- А) мягкую резиновую щетку-напалечник
- Б) ватный тампон
- В) детскую зубную щетку
- Г) детскую зубную щетку и гелевую зубную пасту

**415. [T002483] ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ**

- А) мягкую
- Б) не используется
- В) средней жесткости
- Г) жесткую

**416. [T002484] ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ**

- А) мягкую
- Б) очень мягкую
- В) средней жесткости
- Г) жесткую

**417. [T002485] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗУБНЫХ НИТЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ  
УДАЛЕНИЯ ЗУБНОГО НАЛЕТА С ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБОВ**

- А) проксимальных
- Б) вестибулярных
- В) окклюзионных
- Г) оральных

**418. [T002486] ЗУБОЧИСТКИ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ**

- А) остатков пищи из межзубных промежутков
- Б) зубного налета с гладких поверхностей зубов
- В) зубного налета с контактных поверхностей зубов
- Г) зубного камня

**419. [T002487] ДЛЯ БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ ВСЕХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И УЧАСТКОВ ЗУБОВ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ С ФОРМОЙ ПОДСТРИЖКИ ВОЛОКОН РАБОЧЕЙ ЧАСТИ**

- А) с различной высотой и направлением пучков щетины
- Б) прямой
- В) V-образной
- Г) с выпуклой

**420. [T002488] ПРИ ОЧИЩЕНИИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ И ОРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБОВ ПРАВИЛЬНЫМИ СЧИТАЮТСЯ ДВИЖЕНИЯ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ В НАПРАВЛЕНИИ**

- А) вертикальном (от десны к режущему краю или жевательной поверхности)
- Б) вертикальном (от режущего края или жевательной поверхности к десне)
- В) горизонтальном (вправо-влево, вперед-назад, параллельно десне)
- Г) направление не имеет значения

**421. [T002489] ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБОВ ОТ НАЛЕТА НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- А) зубные нити
- Б) зубную щетку и зубную пасту
- В) вращающуюся щеточку и полировочную пасту
- Г) зубочистки

**422. [T002490] ДЛЯ БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ МЕЖЗУБНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ С ФОРМОЙ ПОДСТРИЖКИ ВОЛОКОН РАБОЧЕЙ ЧАСТИ**

- А) зигзагообразной
- Б) короткой
- В) выпуклой
- Г) прямой

**423. [T002491] RDA - ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ**

- А) абразивности зубной пасты
- Б) содержания фторида в зубной пасте
- В) эффективности зубной пасты
- Г) жесткости зубной щетки

**424. [T002492] ДЕТЯМ 2-Х ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- А) детские зубные пасты на гелевой основе
- Б) зубные пасты с высоким содержанием фторида
- В) зубной порошок
- Г) гигиенические зубные пасты на меловой основе

**425. [T002494] ПЕРВЫМ ЭТАПОМ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЧИСТКИ ЗУБОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) определение гигиенического состояния полости рта пациента
- Б) обучение пациента чистке зубов на моделях
- В) самостоятельная чистка зубов пациентом
- Г) индивидуальный подбор пациенту средств гигиены полости рта

**426. [T002495] САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ ПАЦИЕНТОМ ПОД КОНТРОЛЕМ СПЕЦИАЛИСТА - ЭТО**

- А) контролируемая чистка зубов
- Б) индивидуальная гигиена полости рта
- В) профессиональная гигиена полости рта
- Г) профессиональная чистка зубов

**427. [T002496] ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- А) пациентом
- Б) гигиенистом стоматологическим
- В) ассистентом врача-стоматолога
- Г) врачом-стоматологом

**428. [T002498] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СРІТН У ЛИЦ МОЛОЖЕ 20 ЛЕТ ОСМАТРИВАЮТ**

- А) 16, 11, 26, 36, 31, 46 зубы
- Б) 17, 16, 11, 37, 31, 46 зубы
- В) 16, 11, 31, 46 зубы
- Г) 16, 11, 26, 31 зубы

**429. [T002499] С ПОМОЩЬЮ КАКОГО ИНСТРУМЕНТА ОПРЕДЕЛЯЮТ ИНДЕКС CPITN**

- А) пуговчатый зонд
- Б) градуированный зонд
- В) прямой стоматологический зонд
- Г) угловой стоматологический зонд

**430. [T002500] КАКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ГИНГИВИТА СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА РМА РАВНО 31-60%**

- А) средняя
- Б) легкая
- В) тяжелая
- Г) очень тяжёлая

**431. [T002503] КАКОЙ СТЕПЕНИ ЖЕСТКОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА**

- А) мягкая
- Б) жесткая
- В) средняя
- Г) любая

**432. [T002504] ОСОБЕННОСТЬЮ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА У ЛИЦ СО СЪЕМНЫМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) полоскание полости рта и очистка протезов под проточной водой после каждого приема пищи
- Б) антисептические полоскания
- В) чистка протезов ежедневно зубной щеткой
- Г) хранение протезов в сухом месте

**433. [T002505] ОКРАШИВАЮЩИЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗУБНОГО НАЛЕТА**

- А) раствор фуксина
- Б) раствор амидопирин
- В) раствор азопирама
- Г) раствор бриллиантового зелёного

**434. [T002506] В НАБОР ГИГИЕНИСТА ДЛЯ ОСМОТРА ПОЛОСТИ РТА ВХОДИТ**

- А) зеркало, зонд
- Б) ручной скайлер
- В) зеркало, гладилка зеркало, зонд, элеватор
- Г) скальпель, иглодержатель

**435. [T002507] МЕТОД ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧИСТКИ ЗУБОВ, ПРИ КОТОРОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО КРУГОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ**

- А) Фонеса
- Б) Басса
- В) Рейте
- Г) стандартный

**436. [T002508] ЗУБНАЯ ЩЕТКА ХРАНИТСЯ**

- А) в открытой емкости щеткой вверх
- Б) в закрытом футляре
- В) в закрытом футляре щеткой вверх
- Г) в открытой емкости щеткой вниз

**437. [T002509] ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 3 мин
- Б) 1 мин
- В) 5 мин
- Г) 10 мин

**438. [T002510] САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ МЕТОД ЧИСТКИ ЗУБОВ**

- А) стандартный метод
- Б) метод Леонарда
- В) метод Фонеса
- Г) метод Чартера

**439. [T002511] ОКРАШИВАНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАСТВОРОМ ФУКСИНА ДАЕТ ЦВЕТ**

- А) малиново–розовый
- Б) зеленый
- В) коричневый
- Г) синий

**440. [T002512] МЕТОД ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧИСТКИ ЗУБОВ, В КОТОРОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, КРУГОВЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ**

- А) стандартный метод
- Б) метод Рейте
- В) метод Леонарда
- Г) метод Фонеса

**441. [T002513] ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) гигиенические индексы
- Б) индекс КПУ
- В) диспансеризацию
- Г) санацию

**442. [T002514] В СЛУЧАЕ УХУДШЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗУБОВ ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСА ФЕДОРОВА- ВОЛОДКИНОЙ**

- А) увеличивается
- Б) значительно уменьшается
- В) незначительно уменьшается
- Г) без изменений

**443. [T002515] ОСНОВНОЙ НЕДОСТАТОК ЗУБНЫХ ПОРОШКОВ**

- А) быстрая загрязняемость микроорганизмами
- Б) слабая абразивность
- В) отсутствие пенообразования
- Г) неприятный вкус

**444. [T002517] АКТИВНЫМ МЕТОДОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) занятие по обучению гигиене полости рта
- Б) издание научно-популярной литературы
- В) издание рекламных буклетов
- Г) проведение выставок

**445. [T002518] КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА, КОТОРУЮ МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С ОБОСТРЕНИЕМ ПАРОДОНТИТА (%)**

- А) 0,2
- Б) 5
- В) 10
- Г) 40

**446. [T002519] ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПО УЛУЧШЕНИЮ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) снижение величины гигиенических индексов
- Б) повышение величины гигиенических индексов
- В) снижение индекса КПУ
- Г) повышение индекса КП

**447. [T002520] ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) своевременное пломбирование кариозных полостей
- Б) прием жесткой пищи
- В) применение реминерализирующих растворов
- Г) применение ополаскивателей

**448. [T002521] К ПРОФИЛАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА ОТНОСИТСЯ**

- А) диспансерное наблюдением в случае обнаружения хронических заболеваний СОПР
- Б) своевременный прием антибактериальных препаратов
- В) чистка языка с использованием жесткой щетки
- Г) вакцинация

**449. [T002522] ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С АПРОКСИМАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ**

- А) флосса
- Б) щеточки для языка
- В) монопучковой щетки
- Г) обычной зубной щетки



**450. [T002523] ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) рациональная гигиена полости рта
- Б) сбалансированное питание
- В) полоскание полости рта растворами фторидов
- Г) санация полости рта

**451. [T002524] ДЕТЯМ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ЗУБОВ РЕКОМЕНДУЮТ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ**

- А) лечебно-профилактические с фторидом
- Б) гигиенические
- В) лечебно-профилактические с растительными добавками
- Г) лечебно-профилактические с антисептиками

**452. [T002525] ЗУБНАЯ ЩЕТКА С ПРОДОЛЬНЫМ V-ОБРАЗНЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ**

- А) ухода за полостью рта пациентов с брекет-системами
- Б) очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
- В) очищения межзубных промежутков
- Г) ухода за полостью рта пациентов с заболеваниями пародонта

**453. [T002526] ОДНИМИ ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЗУБНЫХ ПАСТ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) абразивные вещества
- Б) антисептики
- В) экстракты лекарственных растений
- Г) солевые добавки

**454. [T002527] В КАЧЕСТВЕ АКТИВНОГО КОМПОНЕНТА В ПРОТИВОКАРИОЗНЫХ ЗУБНЫХ ПАСТАХ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) фториды
- Б) пирофосфаты
- В) экстракты лекарственных растений
- Г) хлоргексидин

**455. [T002528] В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В СОСТАВ ЗУБНЫХ ПАСТ ВВОДЯТ**

- А) экстракты лекарственных растений
- Б) фторид натрия
- В) карбонат кальция
- Г) карбамид

**456. [T002529] В КАЧЕСТВЕ ПЕНООБРАЗУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА В СОСТАВ ЗУБНЫХ ПАСТ ВВОДИТСЯ**

- А) лаурилсульфат натрия
- Б) дикальцийфосфат
- В) полиэтиленгликоль
- Г) фторид натрия

**457. [T002530] ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ НЕ СОДЕРЖАТ В СВОЕМ СОСТАВЕ**

- А) экстракты лекарственных растений
- Б) увлажняющие компоненты
- В) абразивные вещества
- Г) гелеобразующие компоненты

**458. [T002531] ПРОТИВОКАРИОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЗУБНЫХ ПАСТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕНО ВВЕДЕНИЕМ В ИХ СОСТАВ**

- А) фторидов
- Б) пирофосфатов
- В) экстрактов лекарственных растений
- Г) хлоргексидина

**459. [T002532] ГЛИЦЕРИН ВХОДИТ В СОСТАВ ЗУБНЫХ ПАСТ КАК КОМПОНЕНТ**

- А) увлажняющий
- Б) абразивный
- В) пенообразующий
- Г) ароматизирующий

**460. [T002533] ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ**

- А) очищающим
- Б) регенерирующим
- В) отбеливающим
- Г) десенситивным

**461. [T002534] ЗУБНЫЕ ПАСТЫ С СОЛЕВЫМИ ДОБАВКАМИ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ**

- А) противовоспалительных
- Б) противокариозных
- В) снижающих чувствительность твердых тканей зубов
- Г) отбеливающих

**462. [T002535] СОЕДИНЕНИЯ КАЛЬЦИЯ МОГУТ ВХОДИТЬ В СОСТАВ ЗУБНЫХ ПАСТ В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА**

- А) противокариозного
- Б) связующего
- В) отбеливающего
- Г) пенообразующего

**463. [T002536] ЗУБНЫЕ ПАСТЫ С ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ АБРАЗИВНОСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- А) лицами, злоупотребляющими курением
- Б) основной массой населения
- В) пациентами с повышенной чувствительностью твердых тканей зубов
- Г) детьми дошкольного возраста

**464. [T002537] В КАЧЕСТВЕ АБРАЗИВНОГО КОМПОНЕНТА В СОСТАВ ЗУБНЫХ ПАСТ ВВОДЯТ**

- А) дикальцийфосфат
- Б) монофторфосфат натрия
- В) хлорид стронция
- Г) гидроксиапатит

**465. [T002538] ПРОТИВОКАРИОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЗУБНЫХ ПАСТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕНО ВВЕДЕНИЕМ В ИХ СОСТАВ**

- А) соединений кальция
- Б) пирофосфатов
- В) экстрактов лекарственных растений
- Г) хлоргексидина

**466. [T002539] ПИРОФОСФАТЫ ВХОДЯТ В СОСТАВ ЗУБНЫХ ПАСТ В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТОВ**

- А) препятствующих образованию зубного камня
- Б) противокариозных
- В) противовоспалительных
- Г) абразивных

**467. [T002540] ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ В СОСТАВ ЗУБНЫХ ПАСТ В КАЧЕСТВЕ АКТИВНОГО КОМПОНЕНТА ВВОДЯТ**

- А) хлорид стронция, нитрат калия, гидроксиапатит
- Б) пирофосфаты, солевые добавки
- В) экстракты лекарственных растений, хлоргексидин
- Г) ферменты, витамины

**468. [T002541] МОНОФТОРФОСФАТ НАТРИЯ В СОСТАВЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ПАСТ ОБУСЛАВЛИВАЕТ ИХ ДЕЙСТВИЕ**

- А) противокариозное
- Б) противовоспалительное
- В) отбеливающее
- Г) десенсиитивное

**469. [T002542] ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В СОСТАВ ЗУБНЫХ ПАСТ ВВОДЯТ**

- А) триклозан
- Б) фторид натрия
- В) экстракты лекарственных растений
- Г) карбамид

**470. [T002543] В КАЧЕСТВЕ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТОВ В СОСТАВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ПАСТ ВКЛЮЧАЮТ**

- А) фторид натрия
- Б) фторид железа
- В) фторид алюминия
- Г) фторид платины

**471. [T002544] ВИТАМИНЫ А И Е ВВОДЯТ В СОСТАВ ЗУБНЫХ ПАСТ ДЛЯ**

- А) ускорения регенерации слизистой оболочки полости рта
- Б) профилактики кариеса
- В) уменьшения образования зубных отложений
- Г) улучшения общего состояния организма

**472. [T002545] В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В СОСТАВ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА ВВОДЯТ**

- А) хлоргексидин
- Б) этиловый спирт
- В) фторид олова
- Г) монофторфосфат натрия

**473. [T002546] ПАЦИЕНТАМ С БРЕКЕТ-СИСТЕМАМИ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОЧИЩЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ДУГОЙ И ЗУБАМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- А) зубные ершики
- Б) зубную щетку с ровной подстрижкой щетины
- В) электрическую зубную щетку
- Г) зубочистки

**474. [T002547] ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- А) дезинфицирующие таблетки
- Б) дистиллированную воду
- В) раствор хлоргексидина 0,06%
- Г) раствор перекиси водорода 3%

**475. [T002548] ПАЦИЕНТАМ С БРЕКЕТ-СИСТЕМАМИ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОЧИЩЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ДУГОЙ И ЗУБАМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- А) суперфлоссы
- Б) мануальную зубную щетку
- В) электрическую зубную щетку
- Г) зубочистки

**476. [T002549] ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВОЗ, КОНЦЕНТРАЦИЯ ФТОРИДА В ЗУБНЫХ ПАСТАХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ (PPM)**

- А) 1000
- Б) 500
- В) 2000
- Г) 5000

**477. [T002550] В РАЙОНЕ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРИДА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ**

- А) фторидсодержащие
- Б) кальцийсодержащие
- В) гигиенические
- Г) с растительными добавками

**478. [T002551] ПАЦИЕНТАМ С КЛИНОВИДНЫМ ДЕФЕКТОМ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ**

- А) мягкую
- Б) средней жесткости
- В) жесткую
- Г) очень жесткую

**479. [T002552] ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТКОЙ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ И ВЫСОКОАБРАЗИВНОЙ ЗУБНОЙ ПАСТЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ**

- А) клиновидного дефекта твердых тканей зубов
- Б) гипоплазии эмали
- В) флюороза
- Г) очагов деминерализации эмали

**480. [T002553] ПАЦИЕНТАМ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ РЕКОМЕНДУЮТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ**

- А) мягкой
- Б) средней степени жесткости
- В) жесткой
- Г) очень жесткой

**481. [T002554] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТКОЙ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ**

- А) повышенной чувствительности твердых тканей зуба
- Б) гиперплазии эмали
- В) гипоплазии эмали
- Г) флюорозу

**482. [T002555] ЖЕСТКОСТЬ ВОЛОКНА ЗУБНОЙ ЩЕТКИ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПАЦИЕНТАМ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ, ДОЛЖНА БЫТЬ**

- А) очень мягкой и мягкой
- Б) мягкой и средней
- В) средней и жесткой
- Г) жесткой и очень жесткой

**483. [T002556] СТЕПЕНЬ АБРАЗИВНОСТИ ЗУБНЫХ ПАСТ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПАЦИЕНТАМ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ, ДОЛЖНА БЫТЬ**

- А) низкой
- Б) средней
- В) высокой
- Г) не содержать абразива

**484. [T002557] ДЛЯ ОБТУРАЦИИ ДЕНТИННЫХ КАНАЛЬЦЕВ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ В ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ВВОДЯТ**

- А) соединения фтора, кальция, стронция
- Б) лаурилсульфат натрия, лаурилсаркозинат натрия, спирт
- В) сорбитол, глицерин, пропиленгликоль
- Г) диоксид кремния, двуокись кремния, химически осажденный мел

**485. [T002558] ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ**

- А) с растительными добавками
- Б) фторидсодержащие
- В) кальцийсодержащие
- Г) отбеливающие

**486. [T002559] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИХ ЗУБНЫХ ПАСТ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) высокое содержание фторида в питьевой воде
- Б) кровоточивость десен
- В) низкое содержание фторидов в питьевой воде
- Г) наличие у пациента большого количества пломб

**487. [T002560] ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖЕВАТЕЛЬНУЮ РЕЗИНКУ ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ СОСТАВЛЯЕТ (МИНУТ)**

- А) 5-10
- Б) 20-30
- В) более 1 часа
- Г) использование не связано с приемом пищи

**488. [T002561] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ ПОСЛЕ ЕДЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СПОСОБСТВУЕТ**

- А) увеличению скорости и количества слюноотделения
- Б) удалению зубного налета с контактных поверхностей зубов
- В) снижению повышенной чувствительности эмали зубов
- Г) отбеливание зубов

**489. [T002562] ФТОРИДСОДЕРЖАЩИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТЯМ С ВОЗРАСТА (ЛЕТ)**

- А) 2-3
- Б) 1-1,5
- В) 5-6
- Г) 10-12



**490. [T002563] ЗУБНУЮ ПАСТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАЧИНАЯ С ВОЗРАСТА**

- А) 1,5-2 лет
- Б) 5 лет
- В) 6-9 месяцев
- Г) 4 лет

**491. [T002564] ЗУБНЫЕ ПАСТЫ С НИЗКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ АБРАЗИВНОСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- А) пациентами с повышенной чувствительностью твердых тканей зубов
- Б) пациентами с воспалительными заболеваниями пародонта
- В) лицами, злоупотребляющими курением
- Г) пациентами с брекет-системами

**492. [T002565] ЗУБНЫЕ ПАСТЫ С ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ АБРАЗИВНОСТИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ**

- А) 1-2 раза в неделю
- Б) каждый день утром и вечером
- В) каждый день утром
- Г) 2-3 раза в месяц

**493. [T002566] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА СПОСОБСТВУЕТ**

- А) рациональная гигиена полости рта
- Б) покрытие зубов фторидсодержащим лаком
- В) реминерализирующая терапия
- Г) герметизация фиссур

**494. [T002567] ПАЦИЕНТАМ С МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОЧИЩЕНИЯ ПРОМЫВНОЙ ЧАСТИ ПРОТЕЗА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- А) суперфлосс
- Б) мануальную зубную щетку
- В) электрическую зубную щетку
- Г) зубочистки

**495. [T002568] УДАЛЕНИЕ МЯГКОГО ЗУБНОГО НАЛЕТА СПОСОБСТВУЕТ ПРОФИЛАКТИКЕ**

- А) гингивита
- Б) флюороза
- В) зубочелюстных аномалий
- Г) клиновидного дефекта

**496. [T002569] САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛОССОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ С ВОЗРАСТА (ЛЕТ)**

- А) 9-12
- Б) 4-5
- В) 6-8
- Г) 15-16

**497. [T002570] СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ «SENSITIVE», ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- А) пациентами с повышенной чувствительностью твердых тканей зубов
- Б) пациентами с заболеваниями пародонта
- В) лицами, злоупотребляющими курением
- Г) пациентами с ксеростомией

**498. [T002571] ЗУБНЫЕ ПАСТЫ СО СРЕДНИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ АБРАЗИВНОСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- А) основной массой населения
- Б) детьми дошкольного возраста
- В) лицами, злоупотребляющими курением
- Г) пациентами с повышенной чувствительностью твердых тканей зубов

**499. [T002572] ГИДРОКСИАПАТИТ ВВОДИТСЯ В СОСТАВ ЗУБНЫХ ПАСТ ДЛЯ**

- А) снижения повышенной чувствительности зубов
- Б) отбеливания зубов
- В) профилактики воспалительных заболеваний пародонта
- Г) увлажнения слизистой оболочки полости рта

**500. [T002573] ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИМЕЮТ АБРАЗИВНОСТЬ**

- А) низкую
- Б) среднюю
- В) высокую
- Г) неоднородную

**501. [T002574] СРОК СЛУЖБЫ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ \_\_\_ МЕС.**

- А) 3
- Б) 2
- В) 4
- Г) 6

**502. [T002575] КАКИЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ВЫ НАЗНАЧИТЕ РЕБЕНКУ С ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНЬЮ АКТИВНОСТИ КАРИЕСА**

- А) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие соединения фтора
- Б) солевые зубные пасты
- В) гигиенические зубные пасты
- Г) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие экстракты лечебных трав

**503. [T002576] КАКИЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ВЫ НАЗНАЧИТЕ РЕБЕНКУ С ИНТАКТНЫМИ ЗУБАМИ, ЖИВУЩЕМУ В МЕСТНОСТИ С ОПТИМАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ**

- А) гигиеническую зубную пасту
- Б) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую экстракт лечебных трав
- В) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фосфорно-кальциевые соли
- Г) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фтор

**504. [T002577] УКАЖИТЕ СОСТАВ ПАСТЫ ПЛАТОНОВА**

- А) 10 г порошка фосфат-цемента, 10 г глицерина, 3 кап 3% р-ра йода, 3 кап 3% р-ра перекиси водорода
- Б) 5 г порошка фосфат-цемента, 5 г глицерина, 3 кап 5% р-ра йода, 3 кап 3% р-ра перекиси водорода
- В) 10 г порошка фосфат-цемента, 10 г глицерина, 1 кап 5% р-ра йода, 1 кап 6% р-ра перекиси водорода
- Г) 5 г порошка фосфат-цемента, 5 г глицерина, 3 кап 3% р-ра йода, 3 кап р-ра перекиси водорода 3%

**505. [T002578] Р-Р, СОСТОЯЩИЙ ИЗ 1 Г ЙОДА, 2 Г ЙОДИСТОГО КАЛИЯ, 40 МЛ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ - ЭТО**

- А) р-р Шиллера-Писарева
- Б) р-р фуксина
- В) р-р Люголя
- Г) р-р метиленового синего

**506. [T002579] УКАЖИТЕ СОСТАВ ПАСТЫ ПЕККЕРА**

- А) 10 г пемзы, 10 г глицерина, 3-5 кап 3% р-ра йода, 3-5 кап 3% р-ра перекиси водорода
- Б) 5 г пемзы, 10 г глицерина, 1-3 кап 3% р-ра йода, 1-3 кап 3% р-ра перекиси
- В) 10 г пемзы, 10 г глицерина, 3 кап 5% р-ра йода, 3 кап 6% р-ра перекиси водорода
- Г) 5 г пемзы, 5 г глицерина, 3-5 кап 3% р-ра йода, 3-5 кап 3% р-ра перекиси водорода

**507. [T002580] ДЛЯ АППЛИКАЦИЙ ПРИМЕНЯЮТ ВОДНЫЙ РАСТВОР РЕМОДЕНТА**

- А) 3%
- Б) 5%
- В) 2%
- Г) 1%

**508. [T002581] РАЗМЕРЫ ГОЛОВКИ ДЕТСКОЙ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ**

- А) длина 18-25 мм, ширина 7-9 мм
- Б) длина 12-23 мм, ширина 2-3 мм
- В) длина 17-23 мм, ширина 6-8 мм
- Г) длина 23-30 мм, ширина 7,5-11 мм

**509. [T002582] РАЗМЕРЫ ГОЛОВКИ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  
ДЛИНА \_\_\_ММ/ШИРИНА \_\_\_ММ**

- А) 23-30/7,5-11
- Б) 30-33/7-10
- В) 12-23/2-3
- Г) 18-25/7-9

**510. [T002583] ОПТИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КУСТАМИ ЩЕТИНЫ  
ЗУБНОЙ ЩЕТКИ \_\_\_ММ**

- А) 2,2-2,5
- Б) 2-2,5
- В) 2,1-2,6
- Г) 1,4-2,1

**511. [T002584] ФЛОССЫ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ОЧИСТКИ:**

- А) контактных поверхностей зуба
- Б) вестибулярной поверхности зуба
- В) жевательной поверхности зуба
- Г) оральной поверхности зуба

**512. [T002585] ПЕРЕЧИСЛИТЬ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ**

- А) "Новинка-72", "Экстра", "Новая"
- Б) "Особая"
- В) "Айра"
- Г) "Мери"

**513. [T002586] ПЕРЕЧИСЛИТЬ СОЛЕВЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ**

- А) "Мери"
- Б) "Бальзам"
- В) "Особая"
- Г) "Ягодка"

**514. [T002587] ПЕРЕЧИСЛИТЬ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ФЕРМЕНТЫ**

- А) "Бело-розовая"
- Б) "Ромашка"
- В) "Прима"
- Г) "Ремодент"

**515. [T002588] ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПРОТИВОКАРИОЗНЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ**

- А) "Арбат"
- Б) "Юбилейная"
- В) "Прима"
- Г) "Экстра"

**516. [T002589] ЗУБНЫЕ ПАСТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ФЕРМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ**

- А) гингивите
- Б) флюорозе
- В) пародонтозе
- Г) множественном кариесе

**517. [T002590] ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУБНОЙ ПОРОШОК ДЕТЯМ**

- А) нельзя
- Б) можно при нерегулярной гигиене полости рта
- В) можно 1 раз в месяц
- Г) можно 1 раз в неделю

**518. [T002591] В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО ОЦЕНИТЬ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА С ПОМОЩЬЮ ТАБЛЕТКИ**

- А) эритрозина
- Б) фторида натрия
- В) глюконата кальция
- Г) аскорбиновой кислоты

**519. [T002592] ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ЧИСТКЕ ЗУБОВ СТАНДАРТНЫМ МЕТОДОМ**

- А) круговые
- Б) горизонтальные
- В) подметающие
- Г) вертикальные

**520. [T002593] СИМПТОМАМИ ГИНГИВИТА ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) кровоточивость и отечность десен
- Б) патологическая стираемость и подвижность зубов
- В) изменения прикуса и рецессия десны
- Г) жжение языка и ксеростомия

**521. [T002594] НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЗРЕВАНИЕ ЭМАЛИ ОКАЗЫВАЕТ**

- А) фтор
- Б) калий
- В) молибден
- Г) цинк

**522. [T002595] ОСНОВНОЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ПАРОДОНТИТА**

- А) гигиена полости рта
- Б) укрепление здоровья
- В) лечение кариозных зубов
- Г) протезирование недостающих зубов

**523. [T002596] ВЫБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МЯГКОГО ЗУБНОГО НАЛЕТА**

- А) вращающиеся циркулярные щеточки со специальными полировочными пастами
- Б) ультразвуковые скейлеры
- В) экскаваторы
- Г) кюреты

**524. [T002597] ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЧИСТКУ ЗУБОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ**

- А) только в стоматологическом кабинете
- Б) в домашних условиях
- В) в домашних условиях и в стоматологическом кабинете
- Г) в стационаре

**525. [T002598] ПОСЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВЕСТИ**

- А) покрытие зубов фторлаком
- Б) герметизацию фиссур
- В) окрашивание зубов йодсодержащими растворами
- Г) контролируемую чистку зубов

**526. [T002599] ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНСТРУМЕНТЫ**

- А) скейлеры, кюреты, экскаватор
- Б) экскаватор, штопфер, гладилку
- В) зонд, зеркало, пинцет
- Г) пинцет, экскаватор, пульпоэкстрактор

**527. [T002600] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ЖЕВАТЕЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ЗУБОВ ОЧИЩАЮТ С ПОМОЩЬЮ**

- А) щеточек и полировочных паст
- Б) зубной щетки и пасты
- В) резиновых колпачков и полировочных паст
- Г) флоссов

**528. [T002601] ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) профессиональное удаление зубных отложений
- Б) герметизацию фиссур
- В) лечение зубов
- Г) пломбирование кариозных полостей

**529. [T002602] МЕТОД УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СМЕСЬЮ ВОДЫ И ПОРОШКА ПРИВОДИМОЙ В ДВИЖЕНИЕ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ**

- А) воздушно-абразивный
- Б) ультразвуковой
- В) порошково-звуковой
- Г) пьезоэлектрический

**530. [T002603] ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАНУАЛЬНОГО МЕТОДА СНЯТИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ**

- А) недавно прорезавшиеся постоянные зубы
- Б) травма в полости рта
- В) заболевание височно- нижнечелюстного сустава
- Г) подвижность зубов 2 степени

**531. [T002604] ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ**

- А) отсутствие давления на зуб
- Б) использовать только на вестибулярной поверхности
- В) использовать с медикаментозными средствами для удаления налета
- Г) максимальное давление на зуб

**532. [T002605] ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНДЕКСА 1,5 ПО ГРИНУ- ВЕРМИЛЬОНУ ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ЧТО УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА**

- А) удовлетворительный
- Б) неудовлетворительный
- В) плохой
- Г) хороший



**533. [T002606] ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНДЕКСА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИГИЕНЫ (PHR) БОЛЕЕ 1,7**

- А) неудовлетворительный
- Б) удовлетворительный
- В) хороший
- Г) отличный

**534. [T002607] СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЩЕТОЧКИ ДЛЯ ЯЗЫКА**

- А) помещают на спинку языка, ближе к корню, продвигают вперед, слегка надавливая
- Б) щеточку перемещают от кончика языка к корню без нажима
- В) щеточку помещают на боковую поверхность языка, продвигая ее в разных направлениях
- Г) без особых указаний

**535. [T002608] ПРИ ЧИСТКЕ АПРОКСИМАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБОВ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ**

- А) нить (флосс)
- Б) зубная щетка
- В) межзубные стимуляторы
- Г) полоскание

**536. [T002609] КРАСИТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗУБНОЙ БЛЯШКИ**

- А) 6% р-р фуксина
- Б) раствор йода спиртовой
- В) бриллиантовый зелёный
- Г) анилиновый жёлтый

**537. [T002610] ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ГРИНА-ВЕРМИЛЬОНА 1,6 СЧИТАЕТСЯ**

- А) удовлетворительным
- Б) плохим
- В) неудовлетворительным
- Г) хорошим

**538. [T002611] ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЗУБНОЙ ЩЕТКИ С ИСКУССТВЕННЫМ ЩЕТОЧНЫМ ПОЛЕМ**

- А) отсутствие срединного канала
- Б) отсутствие травмирующей жесткости
- В) возможность фигурной подстрижки
- Г) нет преимуществ

**539. [T002612] ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ ОКРАШИВАНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕСТИ НИЖНИХ ЗУБОВ**

- А) Федорова-Володкиной
- Б) CRITN
- В) пародонтальный
- Г) РМА

**540. [T002613] ИНДЕКС ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МЯГКОГО ЗУБНОГО НАЛЕТА ИЛИ ЗУБНОГО КАМНЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ**

- А) Грина-Вермильона
- Б) пародонтальный ВОЗ
- В) РМА
- Г) Федорова-Володкиной

**541. [T002614] ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРАВИЛЬНОЙ МЕТОДИКЕ ЧИСТКИ ЗУБОВ С ПРОВЕДЕНИЕМ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПОНЯТИЕ**

- А) контролируемой чистки зубов
- Б) индивидуальной гигиены полости рта
- В) профессиональной гигиены полости рта
- Г) профессиональной чистки зубов

**542. [T002615] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛОССОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ С ВОЗРАСТА (ЛЕТ)**

- А) 9-12
- Б) 4-5
- В) 6-8
- Г) 15-16

**543. [T002616] ОЧИЩЕНИЕ СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ**

- А) утром и вечером
- Б) утром
- В) вечером
- Г) в очищении нет необходимости

**544. [T002617] К ГИГИЕНИЧЕСКИМ ИНДЕКСАМ ОТНОСЯТ**

- А) Грина-Вермильона
- Б) КПУ
- В) SPITN
- Г) ПМА

**545. [T002618] ИНДИКАТОРНЫЕ ЩЕТИНКИ ЗУБНЫХ ЩЕТОК ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ**

- А) определения срока годности щетки
- Б) наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
- В) улучшения эстетического вида
- Г) определения эффективности чистки зубов

**546. [T002619] СИЛОВОЙ (АКТИВНЫЙ) ВЫСТУП ЗУБНЫХ ЩЕТОК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ**

- А) очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
- Б) наиболее эффективного очищения оральных поверхностей
- В) улучшения эстетического вида
- Г) наиболее эффективного очищения языка

**547. [T002620] НАЗНАЧЬТЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ РЕБЕНКУ С III СТЕПЕНЬЮ АКТИВНОСТИ КАРИЕСА**

- А) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие соединения фтора
- Б) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие экстракты лечебных трав
- В) гигиенические зубные эликсиры
- Г) гигиенические зубные пасты и эликсиры

**548. [T002621] ДЕТЯМ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА РЕКОМЕНДУЮТ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ**

- А) лечебно-профилактические с фторидом
- Б) гигиенические
- В) лечебно-профилактические с растительными добавками
- Г) лечебно-профилактические с антисептиками

**549. [T002622] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИХ ЗУБНЫХ ПАСТ ДЕТЬМИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) высокое содержание фторида в питьевой воде
- Б) неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта
- В) наличие у пациента большого количества пломб
- Г) системная гипоплазия эмали

**550. [T002623] К ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ОТНОСЯТСЯ**

- А) зубная щетка и зубная паста
- Б) зубная паста и зубной порошок
- В) зубочистки и флоссы
- Г) зубная паста и ополаскиватель

**551. [T002624] ЗУБНАЯ ПАСТА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ УМЕНЬШЕНИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА**

- А) солевая
- Б) кальцийсодержащая
- В) гигиеническая
- Г) отбеливающая

**552. [T002625] ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ФТОРА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) питьевая вода
- Б) зубная паста
- В) зубной эликсир
- Г) фторированная соль

**553. [T002626] УДАЛЕНИЕ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ**

- А) профессиональной гигиены полости рта
- Б) индивидуальной гигиены полости рта
- В) контролируемой чистки зубов
- Г) реминерализующей терапии

**554. [T002627] ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ НЕ МЕНЕЕ 1 РАЗА В**

- А) 6 месяцев
- Б) месяц
- В) год
- Г) 2 года

**555. [T002628] ДЛЯ РУЧНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДДЕСНЕВОГО ЗУБНОГО КАМНЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНСТРУМЕНТЫ**

- А) кюреты
- Б) штопфер
- В) пародонтальный зонд
- Г) пинцет

**556. [T002629] ДЛЯ РУЧНОГО УДАЛЕНИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНСТРУМЕНТЫ**

- А) серповидные скейлеры, кюреты
- Б) зонд, зеркало, пинцет
- В) экскаватор, штопфер, гладилку
- Г) кюретажные ложки, дрельборы, шпатель

**557. [T002630] ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА ИСПОЛЬЗУЮТ АППАРАТ**

- А) «Пьезон-Мастер»
- Б) «Диагнодент»
- В) Апекслокатор
- Г) РН-метр

**558. [T002631] КЮРЕТЫ ГРЕЙСИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ**

- А) поддесневого зубного камня
- Б) плотного зубного налета
- В) наддесневого зубного камня
- Г) над- и поддесневого зубного камня

**559. [T002632] УДАЛЕНИЕ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ**

- А) воспалительных заболеваний пародонта
- Б) зубочелюстных аномалий
- В) эрозий эмали
- Г) местной гипоплазии

**560. [T002633] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ЖЕВАТЕЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ЗУБОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ОЧИЩАТЬ ОТ НАЛЕТА С ПОМОЩЬЮ**

- А) щеточек и полировочных паст
- Б) флоссов
- В) зубной щетки и пасты
- Г) резиновых колпачков и полировочных паст

**561. [T002635] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ КОНТАКТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ОЧИЩАТЬ ОТ НАЛЕТА С ПОМОЩЬЮ**

- А) флоссов
- Б) зубной щетки и пасты
- В) резиновых колпачков и полировочных паст
- Г) щеточек и полировочных паст

**562. [T002636] СЕРПОВИДНЫЕ СКЕЙЛЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ**

- А) наддесневого зубного камня
- Б) поддесневого зубного камня
- В) плотного зубного налета
- Г) грануляций

**563. [Т002637] МОТЫГИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ**

- А) колец зубного камня
- Б) нависающих краев пломб
- В) грануляций
- Г) мягкого зубного налета

**564. [Т002638] ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ**

- А) гигиенист стоматологический
- Б) ассистент врача-стоматолога
- В) медицинская сестра
- Г) санитарка

**565. [Т002639] УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЮРЕТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ**

- А) всех групп зубов
- Б) контактных поверхностей всех групп зубов
- В) премоляров
- Г) моляров

**566. [Т002640] НАИБОЛЕЕ ЧАСТО НАДЦЕСНЕВОЙ ЗУБНОЙ КАМЕНЬ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ОБЛАСТИ**

- А) оральной поверхности нижних резцов
- Б) контактных поверхностей верхних и нижних резцов
- В) вестибулярной поверхности верхних резцов
- Г) вестибулярной поверхности нижних резцов

**567. [Т002641] КЮРЕТЫ ГРЕЙСИ №1-2 И №3-4 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА**

- А) фронтальных зубах и премолярах
- Б) премолярах и молярах
- В) только резцах
- Г) только молярах

**568. [Т002643] КЮРЕТЫ ГРЕЙСИ №9-10 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА**

- А) молярах
- Б) фронтальных зубах
- В) премолярах
- Г) всех группах зубов

**569. [T002644] КЮРЕТЫ ГРЕЙСИ №11-12 И №13-14 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА**

- А) молярах
- Б) фронтальных зубах
- В) премолярах
- Г) всех группах зубов

**570. [T002645] КЮРЕТЫ ГРЕЙСИ №15-16 И №17-18 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА**

- А) в труднодоступных местах
- Б) фронтальных зубах
- В) премолярах
- Г) молярах

**571. [T002646] ПРИ УДАЛЕНИИ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ИМПЛАНТАТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНСТРУМЕНТЫ**

- А) пластиковые
- Б) стальные
- В) титановые
- Г) твердосплавные

**572. [T002647] В ЗВУКОВЫХ АППАРАТАХ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ (КГц)**

- А) 2-6
- Б) 7-10
- В) 10-15
- Г) 16-45

**573. [T002648] В УЛЬТРАЗВУКОВЫХ АППАРАТАХ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ (КГц)**

- А) 16-45
- Б) 2-6
- В) 7-10
- Г) 10-15



**574. [T002649] В ЗВУКОВЫХ АППАРАТАХ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАБОЧИЙ КОНЧИК ИНСТРУМЕНТА СОЗДАЕТ ДВИЖЕНИЯ**

- А) эллипсовидные
- Б) зигзагообразные
- В) продольные
- Г) поперечные

**575. [T002650] В УЛЬТРАЗВУКОВЫХ АППАРАТАХ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАБОЧИЙ КОНЧИК ИНСТРУМЕНТА СОЗДАЕТ ДВИЖЕНИЯ**

- А) продольные
- Б) эллипсовидные
- В) круговые
- Г) зигзагообразные

**576. [T002651] ПОЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБОВ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРОВОДЯТ**

- А) сразу
- Б) на следующий день
- В) через неделю
- Г) через месяц

**577. [T002652] КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЧИСТКУ ЗУБОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И УСТРАНЕНИЕ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ НАКОПЛЕНИЮ ИХ - ЭТО**

- А) профессиональная гигиена полости рта
- Б) индивидуальная гигиена полости рта
- В) профессиональная чистка зубов
- Г) стоматологического просвещения

**578. [T002653] ПРОФИЛАКТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА СПОСОБСТВУЕТ**

- А) проведение профессиональной гигиены
- Б) прием фторидсодержащих препаратов
- В) реминерализирующая терапия
- Г) уменьшение употребления углеводов

**579. [T002654] С ПОМОЩЬЮ ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОГО МЕТОДА ПРОИЗВОДИТСЯ УДАЛЕНИЕ**

- А) пигментированного зубного налета
- Б) зубного камня
- В) пятен при флюорозе
- Г) очага деминерализации эмали

**580. [T002655] ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ**

- А) размягчения зубного камня
- Б) растворения эмали зуба
- В) полировки поверхности зубов
- Г) удаления бактерий

**581. [T002656] У СЕРПОВИДНЫХ СКЕЙЛЕРОВ В РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ЧИСЛО РЕЖУЩИХ ГРАНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 2
- Б) 1
- В) 3
- Г) 4

**582. [T002657] У ЗОНОСПЕЦИФИЧЕСКИХ КЮРЕТ В РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ЧИСЛО РЕЖУЩИХ ГРАНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 1
- Б) 2
- В) 3
- Г) 4

**583. [T002658] У УНИВЕРСАЛЬНЫХ КЮРЕТ В РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ЧИСЛО РЕЖУЩИХ ГРАНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 2
- Б) 1
- В) 3
- Г) 4

**584. [T002659] ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ВСЛЕДСТВИЕ**

- А) излишнего полирования обнаженных корней зубов
- Б) проведения контролируемой чистки зубов
- В) окрашивания зубного налета в труднодоступных местах
- Г) аппликаций реминерализующими растворами

**585. [T002660] ПОСЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВЕСТИ**

- А) покрытие зубов фторидсодержащим лаком
- Б) герметизацию фиссур
- В) окрашивание зубов йодсодержащим раствором
- Г) контролируемую чистку зубов

**586. [T002661] ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА ПЕРЕД ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ФИССУР**

- А) проводят
- Б) не проводят
- В) ориентируются на сосочные полости рта пациента
- Г) ориентируются на кислотно-щелочной баланс полости рта

**587. [T002662] ХИМИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ ФИССУР АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПЕРЕД ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ**

- А) проводят
- Б) делают в исключительных случаях
- В) не проводят
- Г) категорически запрещено делать

**588. [T002665] С ПОМОЩЬЮ КАКОГО ИНСТРУМЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ НАД- И ПОДДЕСНЕВОГО ЗУБНОГО КАМНЯ**

- А) стоматологический зонд
- Б) пуговчатый зонд
- В) стоматологическое зеркало
- Г) визуально

**589. [T002666] КРИТЕРИЯМИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) гладкость зубов
- Б) языковой тест
- В) незначительное количество зубного налета
- Г) наличие наддесневого зубного камня

**590. [T002667] ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ ПРОВОДЯТ**

- А) реминерализующую терапию
- Б) стимулирующую терапию
- В) противовоспалительную терапию
- Г) санацию полости рта

**591. [T002668] МОЖЕТ БЫТЬ УДАЛЕНО ТОЛЬКО В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ**

- А) поддесневой зубной камень
- Б) пелликула
- В) зубная бляшка
- Г) белое вещество

**592. [T002669] ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПОКАЗАНА ПАЦИЕНТАМ С БРЕКЕТ - СИСТЕМАМИ**

- А) каждые 3 месяца
- Б) один раз в полгода
- В) один раз в год
- Г) каждый месяц

**593. [T002670] ЧИСТКА ЗУБОВ САМИМ ПАЦИЕНТОМ В ПРИСУТСТВИИ СПЕЦИАЛИСТА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) контролируемая чистка зубов
- Б) профессиональная гигиена
- В) индивидуальная гигиена полости рта
- Г) самостоятельная гигиена

**594. [T002671] ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА НЕ ВКЛЮЧАЕТ МЕРОПРИЯТИЕ**

- А) пломбирование кариозных полостей
- Б) контролируруемую чистку зубов
- В) удаление над- и поддесневого зубного камня
- Г) нет правильного ответа

**595. [T002672] ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) профессиональная гигиена полости рта
- Б) медикаментозное противовоспалительное лечение
- В) хирургическое лечение
- Г) ортопедическое лечение

**596. [T002673] ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) удаление над- и поддесневых зубных отложений
- Б) лечение кариеса
- В) открытый кюретаж
- Г) герметизацию фиссур

**597. [T002674] ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА ДЕТЯМ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ**

- А) 2-3 раза в год
- Б) 1 раз в год
- В) ежемесячно
- Г) 1 раз в неделю

**598. [T002675] УДАЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ И МЯГКИХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ УЗ-НАКОНЕЧНИКА И AIR-FLOW ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА**

- А) профессиональным
- Б) индивидуальным
- В) личным
- Г) смешанным

**599. [T002676] УДАЛЕНИЕ НАДДЕСНЕВЫХ И ПОДДЕСНЕВЫХ ТВЕРДЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ УЗ-НАСАДКИ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ**

- А) профессиональной гигиены
- Б) индивидуальной гигиены
- В) чистки зубов
- Г) лечения пародонтитов

**600. [T002677] СОГЛАСНО ОБЩЕМУ ПЛАНУ ЛЕЧЕНИЯ, ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (КРОМЕ НЕОТЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ) НУЖНО НАЧИНАТЬ С**

- А) профессиональной гигиены полости рта
- Б) лечения заболеваний пародонта
- В) выявления кариеса
- Г) эндодонтического лечения

**601. [T002678] КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, УСТРАНЕНИЕ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ НАКОПЛЕНИЮ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПОНЯТИЕ**

- А) профессиональной гигиены полости рта
- Б) индивидуальной гигиены полости рта
- В) стоматологического просвещения
- Г) профилактики стоматологических заболеваний

**602. [T002679] ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ С ИНТЕРВАЛОМ В (МЕС)**

- А) 3
- Б) 1
- В) 6
- Г) 12

**603. [T002680] ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОТБЕЛИВАНИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА/КАРБАМИДА (%)**

- А) 15-38/30-45
- Б) 1-3/5-10
- В) 3-6/10-22
- Г) 6-8/20-30

**604. [T002681] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ЗУБНОЙ НАЛЕТ С ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБОВ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО УДАЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ**

- А) щеточек
- Б) кюрет
- В) Air-flow
- Г) УЗ-скейлера

**605. [T002682] УДАЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ**

- А) профессиональной гигиены
- Б) индивидуальной гигиены
- В) стоматологического просвещения
- Г) стоматологического обследования

**606. [T002683] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОЖОГА ТКАНЕЙ ДЕСНЫ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ НЕОБХОДИМО**

- А) изолировать десну
- Б) обработать десну 3% раствором перекиси водорода
- В) прополоскать рот хлоргексидином
- Г) применить слюноотсос

**607. [T002684] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА КОНТАКТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ОЧИЩАТЬ ОТ НАЛЕТА С ПОМОЩЬЮ**

- А) зубных нитей
- Б) резиновых колпачков и полировочных паст
- В) щеточек и полировочных паст
- Г) зубной щетки и пасты

**608. [T002685] ЗНАЧЕНИЕ PH ЗУБНОГО НАЛЁТА, ОЦЕНИВАЕМОЕ КАК КРИТИЧЕСКОЕ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ, СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 5,5-5,7
- Б) 3,5-4,0
- В) 6,5-7,0
- Г) 7,0-7,5

**609. [T002686] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПОКРЫТИЯ ЗУБОВ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИМ ЛАКОМ ПЕРВОЙ ПРОВОДИТСЯ МАНИПУЛЯЦИЯ**

- А) очищение зубов от налёта
- Б) нанесение фторидсодержащего лака
- В) высушивание зубов
- Г) изоляция от слюны

**610. [T002687] ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА В СТАДИИ МЕЛОВОГО ПЯТНА ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ПРИМЕНЕНИЯ РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) очищение от зубного налёта
- Б) изоляция от слюны
- В) высушивание
- Г) аппликация реминерализирующего средства

**611. [T002688] ФОРМА КАНДИДОЗА, ДЛЯ КОТОРОЙ ХАРАКТЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛОГО «ТВОРОЖИСТОГО» НАЛЕТА**

- А) острый псевдомембранозный кандидоз
- Б) острый атрофический кандидоз
- В) хронический атрофический кандидоз
- Г) хронический гиперпластический кандидоз

**612. [T002689] КАКОЕ ВЕЩЕСТВО ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗУБНОГО НАЛЕТА**

- А) метиленовый синий
- Б) фторид натрия
- В) хлорид натрия
- Г) спиртовой йодосодержащий раствор

**613. [T002690] ПРАКТИЧЕСКИМ ЭТАПОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) навык
- Б) знание
- В) понимание
- Г) убеждение



**614. [T002691] ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ НАВЫКАМ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ НА**

- А) тип восприятия информации каждого ребенка
- Б) уровень стоматологического здоровья
- В) социальную принадлежность
- Г) половую принадлежность обучаемого

**615. [T002692] ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ КОНТИНГЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ**

- А) гигиениста – стоматологического
- Б) воспитателей детских дошкольных учреждений
- В) учителей, педагогов
- Г) медицинских работников общего профиля

**616. [T002693] ВИЗУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ ОБУЧАТЬ МАНУАЛЬНЫМ НАВЫКАМ УХОДА ЗА ЗУБАМИ НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО**

- А) в группе из 5 -7 человек
- Б) индивидуально
- В) в большом коллективе детей
- Г) в присутствии родителей

**617. [T002694] АУДИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ ОБУЧАТЬ МАНУАЛЬНЫМ НАВЫКАМ УХОДА ЗА ЗУБАМИ НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО**

- А) в большом коллективе детей
- Б) индивидуально
- В) в группе из 5 -7 человек
- Г) в присутствии родителей

**618. [T002695] КИНЕСТЕТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ ОБУЧАТЬ МАНУАЛЬНЫМ НАВЫКАМ УХОДА ЗА ЗУБАМИ НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО**

- А) индивидуально
- Б) в группе из 5 -7 человек
- В) в большом коллективе детей
- Г) в присутствии родителей

**619. [T002696] ПОДРОБНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ НАВЫКАМ УХОДА ЗА ЗУБАМИ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНО ДЛЯ ДЕТЕЙ ОРИЕНТИРОВАННЫХ**

- А) аудиально
- Б) визуально
- В) кинестетически
- Г) дигитально

**620. [T002697] ДЕМОНСТРАЦИЯ НА МОДЕЛЯХ МЕТОДОВ ЧИСТКИ ЗУБОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСОЧНО ОФОРМЛЕННЫХ НАГЛЯДНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ НАВЫКАМ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНО ДЛЯ ДЕТЕЙ ОРИЕНТИРОВАННЫХ**

- А) визуально
- Б) аудиально
- В) кинестетически
- Г) дигитально

**621. [T002698] ТЩАТЕЛЬНАЯ ОТРАБОТКА НАВЫКОВ ЧИСТКИ ЗУБОВ НА МОДЕЛЯХ И В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРАВИЛАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНО ДЛЯ ДЕТЕЙ ОРИЕНТИРОВАННЫХ**

- А) кинестетически
- Б) визуально
- В) аудиально
- Г) дигитально

**622. [T002699] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- А) демонстрационные модели зубных рядов, различные виды средств и предметов ухода за полостью рта
- Б) научно-популярную литературу (книги, брошюры)
- В) видеофильмы
- Г) рекламу на ТВ

**623. [T002700] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕКЦИИ ПО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ СРЕДИ ШИРОКИХ МАСС НАСЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА**

- А) видеофильмы
- Б) демонстрационные модели зубных рядов, различные виды средств и предметов ухода за полостью рта
- В) научно-популярную литературу (книги, брошюры)
- Г) выставки со средствами гигиены

**624. [T002701] ЦЕЛЬЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) выработка навыка
- Б) знание
- В) понимание
- Г) убеждение

**625. [T002702] РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ НАЧИНАТЬ ЧИСТИТЬ ДЕТЯМ ЗУБЫ**

- А) после прорезывания первого временного зуба
- Б) с момента рождения
- В) после прорезывания всех временных зубов
- Г) в период смены временных зубов на постоянные

**626. [T002703] ПРОВЕДЕНИЕ «УРОКА ЗДОРОВЬЯ» В ОРГАНИЗОВАННОМ ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ - ЭТО ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ**

- А) групповая
- Б) индивидуальная
- В) массовая
- Г) популяционная

**627. [T002704] ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА ДЕТЕЙ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ**

- А) до рождения ребенка и в период новорожденности
- Б) когда ребенку исполнится 2 года
- В) когда ребенок идет в детский сад
- Г) в период прорезывания первых постоянных зубов

**628. [T002705] ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ В ДОШКОЛЬНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧИНАТЬ С ДЕТЬМИ С ВОЗРАСТА (ЛЕТ)**

- А) 3-4
- Б) 2
- В) 5
- Г) 6

**629. [T002706] АНКЕТИРОВАНИЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНИТЬ**

- А) уровень знаний населения о профилактике стоматологических заболеваний
- Б) гигиеническое состояние полости рта пациентов
- В) качество оказания стоматологической помощи населению
- Г) эффективность работы фирм производителей

**630. [T002707] К АКТИВНОЙ ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- А) беседа с пациентом на стоматологическом приеме
- Б) телевизионная реклама средств ухода за полостью рта
- В) издание научно-популярной литературы
- Г) радиопередача о новых средствах профилактики стоматологических заболеваний

**631. [T002708] В ПРОВЕДЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ УЧАСТВУЮТ**

- А) гигиенист стоматологический
- Б) отоларинголог
- В) врач педиатр
- Г) врач диетолог

**632. [T002709] ГРУППОВОЙ ФОРМОЙ ПРОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) “урок здоровья” в организованном детском коллективе
- Б) беседа с пациентом на стоматологическом приеме
- В) распространение буклетов с информацией о средствах гигиены полости рта
- Г) опрос населения

**633. [T002710] КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) формирование у пациента привычек здорового образа жизни
- Б) мотивация пациента к уходу за полостью рта
- В) приобретение знаний по уходу за полостью рта
- Г) повышение эффективности стоматологической службы

**634. [T002711] ВЫРАБОТКА ПРИВЫЧКИ РЕГУЛЯРНО И ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ ЗУБЫ, ЭТО ПРОЦЕСС**

- А) длительный, требующий многократного повторения навыка
- Б) длительный, требующий понимания
- В) недлительный, не требующий многократного повторения навыка
- Г) недлительный, требующий знания

**635. [T002712] ОБУЧЕНИЕ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ**

- А) активным
- Б) пассивным
- В) групповым
- Г) массовым

**636. [T002713] К ПРАКТИЧЕСКИМ ЭТАПАМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ**

- А) навык, привычка
- Б) знание, понимание
- В) убеждение, навык
- Г) понимание, привычка

**637. [T002714] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СРЕДИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ЗАНЯТИЯ НЕ ВКЛЮЧАЮТ**

- А) лекции
- Б) обучение на моделях
- В) конкурсы
- Г) викторины

**638. [T002715] ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ УРОВНЕ ЗНАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ**

- А) анкетирование
- Б) осмотр полости рта
- В) обучение правилам гигиены полости рта
- Г) рекламные акции средств гигиены

**639. [T002716] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПАЦИЕНТА НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ В ФОРМЕ**

- А) беседы
- Б) игры
- В) «урока здоровья»
- Г) лекции

**640. [T002717] НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИХОДИТЬ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В**

- А) 6 месяцев
- Б) месяц
- В) год
- Г) 2 года и более

**641. [T002718] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ В ФОРМЕ**

- А) игры
- Б) урока
- В) беседы
- Г) лекции

**642. [T002719] СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ СРЕДИ ГРУППЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ (ПОДРОСТКОВ) ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ В ВИДЕ**

- А) индивидуальной беседы с каждым подростком
- Б) игры
- В) семинара
- Г) показа мультфильмов

**643. [T002720] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ В ФОРМЕ**

- А) «урока здоровья»
- Б) игры
- В) беседы
- Г) лекции

**644. [T002721] ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕКЛАМА СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА - ЭТО ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ**

- А) массовая
- Б) индивидуальная
- В) групповая
- Г) региональная

**645. [T002722] СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ДЕТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ**

- А) рекомендации по чистке временных зубов с момента их прорезывания
- Б) беседы о функциях слюнных желез
- В) обучение навыкам снятия зубного камня
- Г) беседы по гигиене жилища

**646. [T002723] СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ**

- А) рекомендации по ограничению в питании детей сахара
- Б) беседы о функциях слюнных желез
- В) рекомендации по соблюдению режима
- Г) беседы по гигиене жилища

**647. [T002724] СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ**

- А) рекомендации по правилам пользования соской-пустышкой
- Б) выявление кариозных зубов
- В) беседы о функциях слюнных желез
- Г) беседы по гигиене жилища

**648. [T002727] СУБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРОВОДЯТ ПО**

- А) результатам анкетирования населения
- Б) количеству стоматологических учреждений
- В) количеству поставленных пломб
- Г) определению гигиенического состояния полости рта пациентов

**649. [T002728] ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРОВОДЯТ ПО**

- А) определению гигиенического состояния полости рта пациентов
- Б) результатам анкетирования населения
- В) количеству стоматологических учреждений
- Г) количеству и качеству рекламы средств гигиены полости рта в СМИ

**650. [T002729] ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЮ ЛЮБЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ - ЭТО**

- А) стоматологическое просвещение
- Б) профессиональная гигиена
- В) анкетирование населения
- Г) санация

**651. [T002730] ВИЗУАЛЬНО- ОРИЕНТИРОВАННЫМ ДЕТЯМ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛАМ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА НЕОБХОДИМО**

- А) наличие красочно оформленных наглядных пособий
- Б) подробное объяснение материала
- В) составление ребусов и логических задач
- Г) тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта

**652. [T002731] АКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада
- Б) телевизионная реклама
- В) проведение выставок средств гигиены полости рта
- Г) издание рекламных буклетов средств гигиены полости рта



**653. [T002732] К АКТИВНЫМ МЕТОДАМ ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ**

- А) урок здоровья
- Б) памятка
- В) брошюра
- Г) анкетирование

**654. [T002733] ПАССИВНЫМ МЕТОДОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) издание научно- популярной литературы
- Б) беседа с пациентом на стоматологическом приеме
- В) проведение «урока здоровья» в школе
- Г) проведение бесед, лекций, докладов

**655. [T002734] МЕТОДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ С УЧАСТИЕМ НАСЕЛЕНИЯ И НАЛИЧИЕМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) активными
- Б) пассивными
- В) индивидуальными
- Г) групповыми

**656. [T002735] ЦЕЛЬЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) мотивация населения к поддержанию стоматологического здоровья
- Б) определение уровня гигиены полости рта среди различных контингентов населения
- В) выявление факторов риска возникновения стоматологических заболеваний
- Г) изучение стоматологической заболеваемости населения

**657. [T002736] ПРОВЕДЕНИЕ БЕСЕДЫ С ПАЦИЕНТОМ ПО ВОПРОСАМ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ - ЭТО ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ**

- А) индивидуальная
- Б) групповая
- В) комплексная
- Г) массовая

**658. [T002737] ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ**

- А) возраста
- Б) уровня стоматологической помощи населению
- В) стоматологического статуса пациента
- Г) гигиенического состояния полости рта пациента

**659. [T002738] ЦЕЛЬЮ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) формирование стойких привычек здорового образа жизни
- Б) формирование знаний о заболевании
- В) формирование знаний о здоровой пище
- Г) формирование знаний о структуре здравоохранения

**660. [T002739] К ПАССИВНЫМ ФОРМАМ ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- А) выпуск брошюр, плакатов
- Б) лекции с населением
- В) беседы с населением
- Г) личные советы пациенту

**661. [T002740] АКТИВНЫМ МЕТОДОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) занятие по обучению гигиене полости рта
- Б) издание научно-популярной литературы
- В) издание рекламных буклетов
- Г) проведение выставок

**662. [T002741] К МЕТОДАМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ**

- А) семинары
- Б) памятки
- В) плакаты
- Г) видеофильмы

**663. [T002742] ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) игры
- Б) лекции
- В) семинары
- Г) беседы

**664. [T002743] ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 10-15 ЛЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) уроки здоровья
- Б) журналы
- В) видеофильмы
- Г) игр

**665. [T002744] К ОБЪЕКТИВНОМУ МЕТОДУ ОЦЕНКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- А) показатель стоматологического статуса
- Б) анкетирование
- В) тестирование
- Г) беседа

**666. [T002745] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) уроки здоровья
- Б) памятки
- В) плакаты
- Г) журналы

**667. [T002746] МЕТОДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- А) активными
- Б) пассивными
- В) индивидуальными
- Г) массовыми

**668. [T002747] СО ВЗРОСЛЫМИ ПАЦИЕНТАМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПРОВОДЯТ В ВИДЕ**

- А) лекций и бесед
- Б) игр
- В) занятий в группе
- Г) викторин

**669. [T002748] ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНО МОЖЕТ БЫТЬ ОЦЕНЕНА**

- А) по изменению показателей гигиенического состояния полости рта
- Б) по количеству поставленных пломб
- В) по количеству стоматологических клиник
- Г) по количеству рекламы средств гигиены полости рта в СМИ

**670. [T002749] КРИТЕРИЯМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНОМ УРОВНЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) улучшение стоматологического здоровья, улучшение осведомленности по вопросам профилактики стоматологических заболеваний более чем у 75% населения
- Б) выпуск санбюлетений, количество бесед по профилактике, охват контролируемой гигиеной рта детей, посещающих организованные детские коллективы
- В) увеличение количества посещений к врачу-стоматологу с профилактической целью и уровня гигиены рта
- Г) увеличение использования населением средств гигиены рта, снижение распространенности заболеваний пародонта

**671. [T002750] К СРЕДСТВАМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ**

- А) рекламные ролики на радио и ТВ
- Б) беседы
- В) лекции
- Г) уроки здоровья

**672. [T002751] САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ В ПЕРВЫЕ 20 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) 1 раз в месяц
- Б) 2 раза в месяц
- В) 3 раза в месяц
- Г) еженедельно

**673. [T002752] САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В ОТНОШЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ**

- А) врач
- Б) родители
- В) дети
- Г) учащиеся

**674. [T002753] САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ - ЭТО**

- А) специальная область науки и здравоохранения, имеющая целью формирование поведения, направленного на обеспечение здоровья коллектива индивидуума и общества в целом
- Б) специальная область науки и здравоохранения, имеющая целью формирование поведения, направленного на обеспечение готовности платить за медицинскую помощь коллектива индивидуума и общества в целом
- В) специальная область науки и здравоохранения, имеющая целью увеличение "индекса здоровья"
- Г) специальная область науки и здравоохранения, изучающая поведение людей в состоянии предболезни

**675. [T002754] ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПРОГРАММ ПРОФИЛАКТИКИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- А) стоматологическую заболеваемость в регионе
- Б) количество потребляемой жевательной резинки в год на человека
- В) содержание карбоната кальция в воде
- Г) количество лиц, болеющих туберкулезом

**676. [T002755] НА САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ВРАЧУСТОМАТОЛОГУ ДЕТСКОМУ ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЫДЕЛЯЕТСЯ**

- А) 6 часов
- Б) 10 часов
- В) 2 часа
- Г) 1 час

**677. [T002756] В ВОЗРАСТЕ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 3 ЛЕТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПРОВОДЯТ С**

- А) родителями
- Б) детьми
- В) учителями
- Г) педиатрами

**678. [T002757] АКТИВНЫМ МЕТОДОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада
- Б) издание научно-популярной литературы
- В) телевизионная реклама
- Г) проведение выставок средств гигиены полости рта

**679. [T002758] К ПАССИВНОМУ МЕТОДУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- А) издание научно-популярной литературы
- Б) проведение «урока здоровья» в школе
- В) беседа с пациентом на стоматологическом приеме
- Г) занятия с беременными женщинами по обучению ухода за полостью рта детей раннего возраста

**680. [T002759] К МАССОВОЙ ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- А) телевизионная реклама средств гигиены полости рта
- Б) беседа с пациентом на стоматологическом приеме
- В) ролевая игра в детском саду
- Г) «урок здоровья» в школе

**681. [T002760] АУДИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ДЕТЯМ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛАМ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА НЕОБХОДИМО**

- А) подробное объяснение материала
- Б) наличие красочно оформленных наглядных пособий
- В) тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта
- Г) составление ребусов и логических задач

**682. [T002761] КИНЕСТЕТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ДЕТЯМ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛАМ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА НЕОБХОДИМО**

- А) тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта
- Б) подробное объяснение материала
- В) наличие красочно оформленных наглядных пособий
- Г) решение кроссвордов на стоматологические темы

**683. [T002762] МЕТОДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИСТОМ И АУДИТОРИЕЙ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- А) активными
- Б) групповыми
- В) пассивными
- Г) популяционными

**684. [T002763] МЕТОДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ ОТСУТСТВИЕ АКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИСТОМ И АУДИТОРИЕЙ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- А) пассивными
- Б) групповыми
- В) массовым
- Г) активными

**685. [T002764] ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ПРОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) беседа с пациентом на стоматологическом приеме
- Б) «урок здоровья» в организованном детском коллективе
- В) лекция о методах и средствах профилактики основных стоматологических заболеваний среди сотрудников промышленного предприятия
- Г) беседа с группой беременных о профилактике стоматологических заболеваний

**686. [T002766] СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ГРУППЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЭФФЕКТИВНЕЕ ПРОВОДИТЬ В ВИДЕ**

- А) игры
- Б) лекции
- В) индивидуальной беседы с каждым ребенком
- Г) показа кинофильма

**687. [T002767] СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ЭФФЕКТИВНЕЕ ПРОВОДИТЬ В ВИДЕ**

- А) викторины
- Б) индивидуальной беседы с каждым ребенком
- В) чтение памяток
- Г) лекции

**688. [T002768] ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ЭТАПАМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) знание, понимание, убеждение
- Б) знание, понимание, навык
- В) навык, привычка, убеждение
- Г) умение, навык, привычка

**689. [T002769] ПРАКТИЧЕСКИМИ ЭТАПАМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) навык, привычка
- Б) знание, понимание
- В) понимание, навык
- Г) убеждение привычка

**690. [T002770] СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ - ЭТО МЕТОД**

- А) профилактики стоматологических заболеваний
- Б) санации полости рта
- В) диспансеризации населения
- Г) реабилитации пациентов

**691. [T002771] СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ**

- А) профилактики стоматологических заболеваний и пропаганды здорового образа жизни
- Б) опроса населения
- В) санации полости рта
- Г) анкетирования населения

**692. [T002772] ОСНОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НЕСЕТ**

- А) гигиенист стоматологический
- Б) педагоги школ
- В) воспитатели детских садов
- Г) медицинские сестры



**693. [T002773] К МЕТОДАМ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА ОТНОСИТСЯ**

- А) проведение «урока гигиены»
- Б) чтение памяток
- В) показ фильмов
- Г) реклама

**694. [T002774] ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛОГО МАНУАЛЬНЫМ НАВЫКАМ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА НАИБОЛЕЕ ВАЖНО ОБУЧЕНИЕ**

- А) индивидуальное
- Б) в группе
- В) на лекции
- Г) на семинаре

**695. [T002775] К СРЕДСТВАМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ**

- А) печатные материалы
- Б) беседы
- В) лекции
- Г) «уроки здоровья»

**696. [T002776] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СРЕДИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТЕЙ 4-Х-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА**

- А) ролевая игра
- Б) урок здоровья
- В) лекция
- Г) индивидуальная беседа

**697. [T002778] НА УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ДЕТЕЙ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ**

- А) половая принадлежность
- Б) тип психологического восприятия информации
- В) метод обучения
- Г) средство обучения

**698. [T002779] К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕКАТЬ**

- А) все ответы верны
- Б) родителей
- В) педиатров
- Г) воспитателей

**699. [T002780] СОГЛАСНО ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ, ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ, ПРОВОДЯТСЯ С КРАТНОСТЬЮ**

- А) 1 раз в год
- Б) 2 раза в год
- В) ежеквартально
- Г) по потребности

**700. [T002781] ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О**

- А) стоматологическом статусе населения
- Б) динамике демографических процессов в регионе
- В) состоянии окружающей среды
- Г) имеющемся персонале и материальных ресурсах

**701. [T002782] ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) индивидуальная гигиена полости рта
- Б) санация полости рта
- В) снижение потребления углеводов
- Г) устранение хронических очагов инфекции

**702. [T002783] ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНЫХ СРЕДСТВ ФТОРИДПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА В РАЙОНАХ С СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ БОЛЕЕ 1,5 МГ/Л**

- А) противопоказано
- Б) показано у детей до 12 лет
- В) показано в сочетании с системными средствами
- Г) показано при плохой гигиене полости рта

**703. [T002784] С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РТА ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОРЫ ФТОРИДА НАТРИЯ**

- А) 0,05%; 0,1%; 0,2%
- Б) 0,01%; 0,02%
- В) 0,02%; 0,05%
- Г) 1%; 2%, 3%

**704. [T002785] ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПОКАЗАНА ПАЦИЕНТАМ С БРЕКЕТ - СИСТЕМАМИ**

- А) каждые 3 месяца
- Б) один раз в полгода
- В) один раз в год
- Г) каждый месяц

**705. [T002786] ПЛАНОВАЯ САНАЦИЯ ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ**

- А) вторичной профилактики
- Б) первичной профилактики
- В) третичной профилактики
- Г) не является методом профилактики

**706. [T002787] КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМОЙ КАРИЕСА ПО ВИНОГРАДОВОЙ Т.Ф.**

- А) 6 раза в год
- Б) 3 раза в год
- В) 4 раза в год
- Г) 2 раза в год

**707. [T002788] АНТЕНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЧИНАЕТСЯ**

- А) на этапе планирования беременности и продолжается до родов
- Б) с 28-й недели беременности и продолжается до родов
- В) с 22-23-й недели беременности и продолжается до родов
- Г) с момента диагностики беременности и продолжается до родов

**708. [T002789] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ МНОГОФОРМНОЙ ЭКССУДАТИВНОЙ ЭРИТЕМЫ ИНФЕКЦИОННО-АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ**

- А) санация очагов фокальной инфекции
- Б) вакцинация ребенка
- В) закаливание и лечебная гимнастика
- Г) исключить прием провоцирующего препарата

**709. [T002790] НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ЭНДОГЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА МОЛОЧНЫХ РЕЗЦОВ**

- А) антенатальный период
- Б) первое полугодие жизни
- В) второе полугодие 1-го года жизни
- Г) не имеет значения

**710. [T002791] НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИХОДИТЬ НЕ РЕЖЕ**

- А) 2 раз в год
- Б) 1 раза в год
- В) 2 раз в месяц
- Г) 1 раза в 2 года

**711. [T002792] ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЛНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ПАЦИЕНТОВ ПРОВОДЯТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В \_\_\_ МЕС.**

- А) 6
- Б) 4
- В) 2
- Г) 3

**712. [T002793] ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ПОЛОСТИ РТА И ПРОТЕЗОВ**

- А) два раза в год
- Б) один раз в три года
- В) один раз в два года
- Г) после ортопедического лечения профилактические осмотры не требуются

**713. [T002794] ЭНДОГЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ВКЛЮЧАЕТ**

- А) укрепление зубов изнутри, общего оздоровления организма
- Б) гигиенический уход за полостью рта, который осуществляется в домашних условиях и в стоматологическом кабинете
- В) уменьшение количества потребляемых углеводов
- Г) применение препаратов фтора и кальция в виде лаков, гелей, аппликаций, полосканий

**714. [T002795] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА, В РЕГИОНАХ С Пониженным содержанием фторида в питьевой воде, является применение**

- А) фторидсодержащих зубных паст
- Б) прием морепродуктов
- В) таблеток фторида натрия
- Г) фторидсодержащего лака

**715. [T002796] К ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ЗУБОВ ОТНОСЯТ ГЕЛИ**

- А) «РОКС Медикал»
- Б) «Хлосайт»
- В) «Метрогил Дента»
- Г) «Холисал»

**716. [T002797] ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ– ЭТО**

- А) система государственных, социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных мер, направленных на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний и сохранение стоматологического здоровья населения
- Б) система мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья населения
- В) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний
- Г) комплекс мер, включающих диагностику заболеваний и динамическое наблюдение

**717. [T002798] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ПОЛОСКАНИЯ 0,05% РАСТВОРОМ ФТОРИДА НАТРИЯ ПРОВОДЯТ**

- А) ежедневно
- Б) 1 раз в неделю
- В) 1 раз в 2 недели
- Г) 1 раз в полгода

**718. [T002799] ПРИМЕНЕНИЕ ФТОРИДСОДЕРЖАЩЕГО ЛАКА СПОСОБСТВУЕТ ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА ЗУБОВ**

- А) временных и постоянных
- Б) временных
- В) постоянных
- Г) только временных

**719. [T002800] УДАЛЕНИЕ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ**

- А) воспалительных заболеваний пародонта
- Б) флюороза
- В) местной гипоплазии
- Г) зубочелюстных аномалий

**720. [T002801] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) ранняя и надежная иммобилизация отломков
- Б) временная иммобилизация отломков
- В) отсроченная иммобилизация отломков
- Г) физиотерапия

**721. [T002802] ПРОФИЛАКТИКОЙ РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) лечение хронических форм периодонтита
- Б) профессиональная гигиена полости рта
- В) отбеливание зубов
- Г) удаление сверхкомплектных зубов

**722. [T002803] ПРОФИЛАКТИКОЙ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) устранение травматического фактора (острые края зубов, зубных протезов)
- Б) изготовление съемных протезов
- В) пункция верхнечелюстной пазухи
- Г) изготовление виниров

**723. [T002804] ПРОФИЛАКТИКОЙ ОДОНТОГЕННЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) ортодонтическое лечение при аномалиях окклюзии
- Б) профессиональная гигиена полости рта
- В) лечение кариеса и его осложнений
- Г) лечение заболеваний пародонта

**724. [T002805] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ НАЧИНАЕТСЯ С**

- А) начала периода минерализации зачатков
- Б) момента прорезывания 1 зуба
- В) момента рождения ребенка
- Г) момента прорезывания 5.2, 5.1, 6.1, 6.2

**725. [T002806] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ДИАСТЕМЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- А) пластика короткой широкой уздечки верхней губы
- Б) миогимнастика для нормализации положения языка в покое
- В) использование вестибулярной пластинки
- Г) использование преортодонтического трейнера

**726. [T002807] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ СОСАНИЯ ПАЛЬЦА ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) вестибулярные пластинки
- Б) аппарат Брюкля
- В) наложение гипсовой лангеты на локтевой сустав ребенка
- Г) аппарат с «шипами»

**727. [T002808] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ДИАСТЕМЫ**

- А) пластика короткой широкой уздечки верхней губы
- Б) миогимнастика для нормализации положения языка в покое
- В) использование вестибулярной пластинки
- Г) использование преортодонтического трейнера

**728. [T002809] ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ СМЫКАНИЯ ГУБ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗУБО-ЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ**

- А) миогимнастику для укрепления круговой мышцы рта
- Б) ношение элайнеров
- В) активатор функции Френкеля IV типа
- Г) аппарат Брюкля

**729. [T002810] КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ**

- А) первичной
- Б) вторичной
- В) третичной
- Г) интерцепционной

**730. [T002811] КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УХУДШЕНИЯ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ**

- А) вторичной
- Б) первичной
- В) экзогенной
- Г) эндогенной

**731. [T002812] ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПО УЛУЧШЕНИЮ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) снижение величины гигиенических индексов
- Б) повышение величины гигиенических индексов
- В) снижение индекса КПУ
- Г) повышение индекса КПУ

**732. [T002813] КОМПЛЕКС МЕР ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАПРАВЛЕН НА**

- А) предупреждение возникновения заболевания
- Б) предупреждение осложнений возникшего заболевания
- В) восстановление анатомической и функциональной целостности зубочелюстной системы
- Г) предупреждение возникновения осложнений и восстановление функции



**733. [T002814] ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) своевременное пломбирование кариозных полостей
- Б) прием жесткой пищи
- В) применение реминерализирующих растворов
- Г) применение ополаскивателей

**734. [T002815] К МЕСТНОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЛЕЙКОПЛАКИИ ОТНОСИТСЯ**

- А) коррекция протезов
- Б) антисептическая обработка полости рта
- В) применение стероидных мазей
- Г) ограничение употребления легкоусвояемых углеводов

**735. [T002816] К ПРОФИЛАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА ОТНОСИТСЯ**

- А) диспансерное наблюдением в случае обнаружения хронических заболеваний СОПР
- Б) своевременный прием антибактериальных препаратов
- В) чистка языка с использованием жесткой щетки
- Г) вакцинация

**736. [T002817] ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ДЕКУБИТАЛЬНОЙ ЯЗВЫ ЯВЛЯЕТСЯ УСТРАНЕНИЕ ФАКТОРА**

- А) механического
- Б) физического
- В) химического
- Г) температурного

**737. [T002818] ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ФУНКЦИЙ ЗУБОВ И ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ ВИДУ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

- А) третичному
- Б) первичному
- В) вторичному
- Г) реабилитационному

**738. [T002819] СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПОВЫШЕННОГО СТИРАНИЯ ЗУБОВ ВКЛЮЧАЕТ**

- А) своевременное зубное протезирование
- Б) ежедневную чистку зубов жесткой зубной щёткой
- В) использование отбеливающих капп
- Г) проведение аллергических проб перед протезированием

**739. [T002820] С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ ПРИ ЧАСТЫХ РЕЦИДИВАХ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- А) культуральная инактивированная герпетическая вакцина
- Б) интерферон лейкоцитарный
- В) кислота аскорбиновая
- Г) гистаглобулин

**740. [T002821] ЭНДОГЕННУЮ ПРОФИЛАКТИКУ КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ В**

- А) антенатальный период
- Б) первое полугодие жизни
- В) второе полугодие первого года жизни
- Г) третий год жизни

**741. [T002822] НАЗНАЧЬТЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ РЕБЕНКУ С III СТЕПЕНЬЮ АКТИВНОСТИ КАРИЕСА**

- А) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие соединения фтора
- Б) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие экстракты лечебных трав
- В) гигиенические зубные эликсиры
- Г) гигиенические зубные пасты и эликсиры

**742. [T002823] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЭМАЛИ ПРОРЕЗАВШИХСЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У КАРИЕСОВОСПРИИМЧИВЫХ ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) гель GC Tooth Mousse
- Б) 30% раствор нитрата серебра
- В) 2 % раствор пищевой соды
- Г) иодид калия

**743. [T002824] ПРИШЛИФОВЫВАНИЕ БУГРОВ МОЛОЧНЫХ КЛЫКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ДЛЯ**

- А) профилактики аномалий окклюзии
- Б) эстетического эффекта
- В) стимуляции прорезывания постоянных зубов
- Г) профилактики ретенции зубов

**744. [T002825] ЧАСТИЧНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ ПРОТЕЗ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ**

- А) дефицита места в зубном ряду для постоянного зуба
- Б) мезиальной окклюзии
- В) вертикальной резцовой дизокклюзии
- Г) дистальной окклюзии

**745. [T002826] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДО \_\_\_\_ ЛЕТ**

- А) 5
- Б) 3
- В) 4
- Г) 2

**746. [T002827] ПРЕОРТОДОНТИЧЕСКИЙ МИОТРЕЙНЕР ЯВЛЯЕТСЯ АППАРАТОМ**

- А) лечебно-профилактическим
- Б) ретенционным
- В) профилактическим
- Г) капповым

**747. [T002828] ПРИВЫЧКА ПРИКУСЫВАНИЯ НИЖНЕЙ ГУБЫ НУЖДАЕТСЯ В**

- А) профилактических мероприятиях
- Б) лечебных мероприятиях
- В) хирургическом лечении
- Г) наблюдении

**748. [T002829] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСФИКСИИ ЯЗЫК ПРОШИВАЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ**

- А) горизонтально
- Б) под углом к средней линии
- В) вертикально по средней линии
- Г) под углом к боковой поверхности языка

**749. [T002830] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСФИКСИИ ЯЗЫК ПРОШИВАЕТСЯ**

- А) на границе задней и средней трети
- Б) в передней трети
- В) по средней линии
- Г) у корня

**750. [T002832] ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ПОЛОСТИ РТА (ФОРМА №049/У) ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ АНАЛИЗА**

- А) профилактической работы среди населения
- Б) эффективности использования оборудования
- В) информированности населения о ЗОЖ
- Г) распределения нагрузки среди врачей

**751. [T002833] ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО И ПО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАНИЯМ ДИСПАНСЕРНОГО ПРИЕМОМ СТОМАТОЛОГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ**

- А) ОМС
- Б) ДМС
- В) бюджетов субъектов РФ
- Г) Федерального бюджета

**752. [T002834] К СПЕЦИФИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ОТНОСИТСЯ**

- А) герметизация фиссур
- Б) стоматологическое просвещение
- В) санация полости рта
- Г) диспансеризация

**753. [T002835] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЯВЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВРЕМЯ ЧИСТКИ НЕ БОЛЕЕ (МИНУТ)**

- А) 2-3
- Б) 1
- В) 4-5
- Г) 6-7

**754. [T002836] ДЕТЯМ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА РЕКОМЕНДУЮТ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ**

- А) лечебно-профилактические с фторидом
- Б) гигиенические
- В) лечебно-профилактические с растительными добавками
- Г) лечебно-профилактические с антисептиками

**755. [T002837] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ НЕОБХОДИМО**

- А) провести санацию полости рта
- Б) снять все ортопедические конструкции
- В) прополоскать рот раствором Шиллера-Писарева
- Г) снять поверхностный слой эмали

**756. [T002838] УСТРАНЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И ПРИЧИН - ЭТО ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**

- А) первичной профилактики стоматологических заболеваний
- Б) вторичной профилактики стоматологических заболеваний
- В) третичной профилактики стоматологических заболеваний
- Г) эпидемиологического обследования населения

**757. [T002839] ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРОВОДЯТ ПО**

- А) динамике показателей гигиенического состояния полости рта пациентов
- Б) результатам анкетирования населения
- В) количеству стоматологических учреждений
- Г) количеству поставленных пломб

**758. [T002840] ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН МОЖНО ОЦЕНИТЬ ПО**

- А) результатам анкетирования
- Б) количеству поставленных пломб
- В) количеству женских консультаций
- Г) уровню оказания стоматологической помощи

**759. [T002841] АНКЕТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА И ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ СУДИТЬ О**

- А) степени информированности индивидуума и общества в целом
- Б) стоматологической заболеваемости
- В) эффективности работы фирм производителей средств гигиены полости рта
- Г) гигиеническом состоянии полости рта пациентов

**760. [T002842] ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- А) определение уровня гигиены
- Б) диспансеризация населения
- В) санация полости рта
- Г) эпидемиологическое стоматологическое обследование

**761. [T002843] ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- А) определение количества лиц, обученных гигиене полости рта
- Б) диспансеризация населения
- В) санация полости рта
- Г) эпидемиологическое стоматологическое обследование

**762. [T002844] ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- А) определение количества проведенных лекций, бесед, занятий
- Б) диспансеризация населения
- В) санация полости рта
- Г) эпидемиологическое стоматологическое обследование

**763. [T002845] ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- А) определение количества представленных материалов по стоматологическому просвещению
- Б) диспансеризация
- В) санация полости рта
- Г) эпидемиологическое стоматологическое обследование

**764. [T002846] ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- А) определение количества средств по уходу за полостью рта, проданных населению
- Б) диспансеризация
- В) санация полости рта
- Г) эпидемиологическое стоматологическое обследование

**765. [T002847] ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- А) определение тенденций стоматологического здоровья в связи с гигиеническими мероприятиями
- Б) диспансеризация
- В) санация полости рта
- Г) эпидемиологическое стоматологическое обследование

**766. [T002848] ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО**

- А) динамике уровня распространенности и интенсивности стоматологических заболеваний
- Б) количеству стоматологических поликлиник
- В) количеству детей, охваченных санацией полости рта
- Г) количеству организованного детского населения

**767. [T002849] ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ВОПРОСАХ ПИТАНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО**

- А) изменению частоты употребления легкоусвояемых углеводов
- Б) потреблению мяса на душу населения
- В) потреблению молока на душу
- Г) употреблению тропических фруктов

**768. [T002850] ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ВОПРОСАХ ПИТАНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО**

- А) изменению состава и качества пищи
- Б) потреблению мяса на душу населения
- В) потребления молока на душу
- Г) употребления тропических фруктов

**769. [T002851] ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОТИВАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ К ПОДДЕРЖАНИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО**

- А) степени вовлечения в профилактические мероприятия
- Б) результатам лечебной работы ЛПУ
- В) работе с диспансерными группами
- Г) результатам эпидемиологического стоматологического обследования

**770. [T002852] ПРОВЕДЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СЧИТАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ, ЕСЛИ**

- А) улучшаются показатели индексов гигиены полости рта
- Б) увеличивается показатель интенсивности кариеса зубов
- В) увеличивается показатель интенсивности кариеса поверхностей
- Г) не изменяются показатели пародонтальных индексов

**771. [T002853] ПРОВЕДЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СЧИТАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ, ЕСЛИ**

- А) улучшаются показатели пародонтальных индексов
- Б) увеличивается показатель интенсивности кариеса зубов
- В) увеличивается показатель интенсивности кариеса поверхностей
- Г) ухудшаются показатели индексов гигиены полости рта

**772. [T002854] ПРОВЕДЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ СЧИТАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ, ЕСЛИ**

- А) снижается прирост кариеса
- Б) увеличивается показатель интенсивности кариеса зубов
- В) увеличивается показатель интенсивности кариеса поверхностей
- Г) увеличиваются показатели индексов гигиены полости рта

**773. [T002855] ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ**

- А) мотивации индивидуумов к сохранению стоматологического здоровья
- Б) распространенности и интенсивности кариеса среди населения
- В) распространенности и интенсивности заболеваний пародонта среди населения
- Г) уровня здоровья населения



**774. [T002856] ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ЧИСТКЕ ЗУБОВ ЗАВИСИТ ОТ**

- А) психомоторных навыков ребенка
- Б) состояния твердых тканей зубов
- В) качества оказания медицинской помощи детям
- Г) уровня стоматологического здоровья ребенка

**775. [T002857] НАИБОЛЬШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОСТИГАЕТСЯ, ЕСЛИ ОНО НАЧИНАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ**

- А) раннем детском
- Б) младшем школьном
- В) подростковом
- Г) взрослом

**776. [T002858] ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН МОЖНО ОЦЕНИТЬ ПО**

- А) динамике показателей гигиены полости рта
- Б) количеству поставленных пломб
- В) качеству оказания стоматологической помощи
- Г) количеству женских консультаций

**777. [T002859] ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН МОЖНО ОЦЕНИТЬ ПО**

- А) динамике показателей пародонтальных индексов
- Б) количеству поставленных пломб
- В) качеству оказания стоматологической помощи
- Г) количеству женских консультаций

**778. [T002860] ВАЖНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА, ЯВЛЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМОГО В ГОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ**

- А) сахара
- Б) мяса
- В) молока
- Г) яиц

**779. [T002861] ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ПАРОДОНТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО**

- А) снижению количества пораженных секстантов по индексу CPI
- Б) снижению интенсивности кариеса зубов
- В) уменьшению распространенности кариеса корня зуба
- Г) снижению распространенности флюороза по индексу Dean

**780. [T002862] ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА ОЦЕНИВАЮТ ПО ДИНАМИКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

- А) индекса ИГР-У
- Б) индексов КПУ, кп
- В) распространенности кариеса зубов
- Г) индекса РМА

**781. [T002863] ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОГЕННЫХ МЕТОДОВ ФТОРПРОФИЛАКТИКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА В СОЧЕТАНИИ С ЭКЗОГЕННЫМИ МЕТОДАМИ**

- А) да
- Б) нет
- В) не имеет значения
- Г) только в период созревания эмали

**782. [T002864] ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЮ ЛЮБЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ САМООЦЕНКИ И ВЫРАБОТКИ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ И ПРИВЫЧЕК, МАКСИМАЛЬНО ИСКЛЮЧАЮЩИХ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ПРИЕМЛЕМЫЙ УРОВЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ - ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

- А) стоматологического просвещения
- Б) анкетирования населения
- В) первичной профилактики стоматологических заболеваний
- Г) ситуационного анализа

**783. [T002865] МОТИВАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ПОДДЕРЖАНИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) целью стоматологического просвещения
- Б) изучением стоматологической заболеваемости населения
- В) методом стоматологического просвещения
- Г) средством стоматологического просвещения

**784. [T002866] ЗА ЕЖЕДНЕВНУЮ ЧИСТКУ ЗУБОВ У РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТВЕТСТВЕННЫ**

- А) родители
- Б) стоматолог
- В) гигиенист стоматологический
- Г) педиатр

**785. [T002867] МЕСТНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) неудовлетворительная гигиена полости рта
- Б) высокое содержание фторида в питьевой воде
- В) низкое содержание фторида в питьевой воде
- Г) сопутствующие соматические заболевания

**786. [T002868] МЕСТНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) повышенное употребление легкоусвояемых углеводов
- Б) высокое содержание фторида в питьевой воде
- В) низкое содержание фторида в питьевой воде
- Г) сопутствующие соматические заболевания

**787. [T002870] НАИБОЛЬШИМ КАРИЕСОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ УГЛЕВОД**

- А) сахароза
- Б) мальтоза
- В) галактоза
- Г) гликоген

**788. [T002871] ВЫСОКОУГЛЕВОДИСТАЯ ДИЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ**

- А) кариеса зубов
- Б) пародонтита
- В) зубочелюстных аномалий
- Г) заболеваний слизистой оболочки

**789. [T002872] РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ ВОЗРАСТАЕТ ПРИ**

- А) увеличении частоты приема сладостей
- Б) снижении частоты приема сладостей
- В) чистке зубов 2 раза в день
- Г) употреблении в пищу твердых продуктов

**790. [T002873] ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВОЗ СУТОЧНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ (ГРАММ)**

- А) 20
- Б) 10
- В) 40
- Г) 60

**791. [T002874] ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГА РОДИТЕЛЯМИ С РЕБЕНКОМ С ЦЕЛЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА СОСТАВЛЯЕТ ОДИН РАЗ В (МЕС.)**

- А) 6
- Б) 3
- В) 9
- Г) 12

**792. [T002875] ФАКТОР, ДЕЙСТВИЕ КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ НАРУШАТЬ ФОРМИРОВАНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ РЕБЕНКА**

- А) наличие экстрагенитальной патологии
- Б) продолжительные прогулки
- В) повышенное употребление воды
- Г) продолжительный ночной сон

**793. [T002876] ФАКТОР, ДЕЙСТВИЕ КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ НАРУШАТЬ ФОРМИРОВАНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ РЕБЕНКА**

- А) профессиональные вредности
- Б) длительные прогулки на свежем воздухе
- В) умеренное занятие физкультурой
- Г) прием витаминов

**794. [T002877] РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ НАЧИНАТЬ ЧИСТИТЬ ДЕТЯМ ЗУБЫ**

- А) сразу после прорезывания первого временного зуба
- Б) с 1 года
- В) с 2-х лет
- Г) с 3-х лет

**795. [T002878] КОНЕЧНЫМ ПРОДУКТОМ МЕТАБОЛИЗМА САХАРОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) органические кислоты
- Б) декстраны
- В) леваны
- Г) гликаны

**796. [T002879] МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ КАРИЕСРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭМАЛИ**

- А) регулярное применение фторидсодержащих паст
- Б) употребление углеводной пищи
- В) отбеливание зубов
- Г) неудовлетворительная гигиена полости рта

**797. [T002880] СНИЖЕНИЮ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА СПОСОБСТВУЮТ ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ**

- А) употребление сырых овощей и фруктов, твердой сухой пищи
- Б) увеличение частоты приема пищи
- В) высокое содержание в пище сахаров
- Г) употребление преимущественно мягкой пищи, не требующей интенсивного жевания

**798. [T002881] ОСНОВНЫМ МЕСТНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) наличие зубного налета
- Б) наследственность
- В) вредные привычки
- Г) наличие эндокринной патологии

**799. [T002882] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) рациональная гигиена полости рта
- Б) сбалансированное питание
- В) санация полости рта
- Г) избирательное пришлифовывание зубов

**800. [T002883] ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТКОЙ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ И ВЫСОКОАБРАЗИВНОЙ ЗУБНОЙ ПАСТЫ МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЮ**

- А) клиновидного дефекта твердых тканей зубов
- Б) гипоплазии эмали
- В) флюороза
- Г) очагов деминерализации эмали

**801. [T002884] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТКОЙ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ**

- А) повышенной чувствительности твердых тканей зуба
- Б) гипоплазии эмали
- В) гиперплазии эмали
- Г) флюорозу

**802. [T002885] ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА ПРОКЛАДЫВАНИЯ ЯЗЫКА МЕЖДУ ФРОНТАЛЬНЫМИ ЗУБАМИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К**

- А) резцовой дизокклюзии
- Б) расширению зубных рядов
- В) сужению зубных рядов
- Г) возникновению диастемы

**803. [T002886] ПРИ ГЛОТАНИИ ПРАВИЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ КОНЧИКА ЯЗЫКА**

- А) в области небной поверхности верхних фронтальных зубов
- Б) между передними зубами
- В) на границе твердого и мягкого неба
- Г) между губами

**804. [T002887] С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОСКУ-ПУСТЫШКУ ДЕТЯМ СТАРШЕ**

- А) 1 года
- Б) 6 месяцев
- В) 2 лет
- Г) 3 лет

**805. [T002889] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ НА \_\_\_\_\_ НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) 6-8
- Б) 20-21
- В) 24-26
- Г) 23-28

**806. [T002890] ПРИ ПЕРВОМ ПОСЕЩЕНИИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕРЕМЕННОЙ ПРОВОДЯТ**

- А) стоматологическое обследование, контролируруемую чистку зубов, беседу о профилактике для улучшения здоровья полости рта женщины, ее будущего ребенка
- Б) профессиональную гигиену полости рта
- В) беседу о профилактике для улучшения здоровья полости рта женщины, ее будущего ребенка контролируруемую чистку зубов
- Г) контролируруемую чистку зубов

**807. [T002891] ПРИ ПОВТОРНОМ ПОСЕЩЕНИИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕРЕМЕННОЙ ПРОВОДЯТ**

- А) профессиональную гигиену полости рта и контролируруемую чистку
- Б) стоматологическое просвещение
- В) обучение чистке зубов
- Г) стоматологическое обследование

**808. [T002892] В ТРЕТЬЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕРЕМЕННОЙ ПРОВОДЯТ**

- А) профессиональную гигиену полости рта и мотивацию к поддержанию здоровья полости рта
- Б) обучение гигиене полости рта
- В) определение индекса гигиены полости рта
- Г) мотивацию к поддержанию здоровья полости рта

**809. [T002893] УХУДШЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ**

- А) плохой гигиены полости рта, беседы о профилактике для улучшения здоровья полости рта женщины, ее будущего ребенка
- Б) беседу о профилактике для улучшения здоровья полости рта женщины, ее будущего ребенка
- В) использования гигиенической зубной пасты
- Г) токсикозов

**810. [T002894] ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОЦЕССЫ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ У ПЛОДА**

- А) замедляются
- Б) ускоряются
- В) остаются на прежнем уровне
- Г) резко увеличиваются

**811. [T002895] НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПЕРВЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ**

- А) 6 месяцев
- Б) 2 месяцев
- В) 1 года
- Г) 3 лет

**812. [T002896] ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИХОДИТЬ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ**

- А) 2 раза в год
- Б) 1 раз в год
- В) 1 раз в 2 года
- Г) 1 раз в месяц

**813. [T002897] РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ НАЧИНАТЬ ЧИСТИТЬ ДЕТЯМ ЗУБЫ С ВОЗРАСТА**

- А) сразу после прорезывания первого временного зуба
- Б) 6 лет
- В) 3 лет
- Г) 2 лет



**814. [T002898] НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ**

- А) кариес зубов
- Б) болезни слизистой оболочки
- В) заболевания пародонта
- Г) заболевания пульпита и периодонтита

**815. [T002899] ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) предупреждение возникновения заболеваний
- Б) восстановление утраченных функций
- В) лечение и предупреждение осложнений заболеваний
- Г) реабилитация больных

**816. [T002900] ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ПОСТУПЛЕНИЯ ФТОРИДА В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА - ЭТО**

- А) питьевая вода
- Б) пищевые продукты
- В) воздух
- Г) витамины

**817. [T002901] ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ФТОРИДЫ**

- А) петрушка, персики, чай, скумбрия
- Б) сыр, молочнокислые продукты
- В) клубника, голубика, черника
- Г) гранаты, арбузы, дыни

**818. [T002902] ИЗ УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ, НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ, СОГЛАСНО ДАННЫМ ВОЗ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) образ жизни
- Б) здравоохранение
- В) наследственность
- Г) внешняя среда

**819. [T002903] К ПЕРВИЧНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ**

- А) нерациональное питание
- Б) артериальную гипертензию
- В) сахарный диабет
- Г) гиперхолестеринемию

**820. [T002904] К ПЕРВИЧНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ**

- А) курение
- Б) артериальную гипертензию
- В) сахарный диабет
- Г) гиперхолестеринемию

**821. [T002905] К ПЕРВИЧНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ**

- А) злоупотребление алкоголем
- Б) артериальную гипертензию
- В) сахарный диабет
- Г) гиперхолестеринемию

**822. [T002907] К ПЕРВИЧНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ**

- А) стресс
- Б) артериальную гипертензию
- В) сахарный диабет
- Г) гиперхолестеринемию

**823. [T002908] ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕЙКОПЛАКИИ**

- А) курение
- Б) острый герпетический стоматит
- В) соматические заболевания
- Г) хронические очаги инфекции в полости рта

**824. [T002909] КУРЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) относительным противопоказанием
- Б) местным противопоказанием
- В) не влияет на выбор метода лечения
- Г) абсолютным противопоказанием

**825. [T002910] МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЛЕЙКОПЛАКИИ ТАППЕЙНЕРА (НИКОТИНОВЫЙ СТОМАТИТ)**

- А) отказ от курения
- Б) отказ от приема крепких алкогольных напитков
- В) рациональное протезирование
- Г) избирательное пришлифовывание зубов

**826. [T002911] ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ МОТИВ К ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ**

- А) возможное озлокачествление лейкоплакии слизистой оболочки рта
- Б) возможная потеря вкуса
- В) возможное развитие ксеростомии
- Г) образование налета курильщика на зубах

**827. [T002912] ФАКТОР КУРЕНИЯ, НЕ ОКАЗЫВАЮЩИЙ КАНЦЕРОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТКАНИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ**

- А) запах изо рта
- Б) температурное воздействие
- В) химическое воздействие
- Г) ионизирующее излучение

**828. [T002913] ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В ПОЛОСТИ РТА НАБЛЮДАЕТСЯ**

- А) пузырьно-сосудистый синдром
- Б) участок дистрофии соединительной ткани
- В) «лакированный» язык
- Г) тортоаномалии

**829. [T002914] ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ РАКА И ПРЕДРАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) отказ от слишком горячей и раздражающей пищи
- Б) сбалансированное питание
- В) устранение хронических очагов инфекции в полости рта
- Г) прием антибиотиков

**830. [T002915] ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЧАГОВОЙ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ**

- А) микроорганизмы зубного налета и простые углеводы пищи
- Б) избыточное содержание фтора в окружающей среде
- В) воспалительный процесс в развивающемся фолликуле
- Г) механическая травма развивающегося фолликула

**831. [T002916] К КАКОМУ КЛАССУ БОЛЕЗНЕЙ ОТНЕСЕНЫ БОЛЕЗНИ ПОЛОСТИ РТА, СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ И ЧЕЛЮСТЕЙ**

- А) болезни органов пищеварения
- Б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- В) симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках
- Г) факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения

**832. [T002917] ВРЕМЕННЫЙ ДИСКOLORИТ ЗУБОВ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕН**

- А) употреблением в пищу красящих продуктов
- Б) наличием отломка инструмента в корневом канале
- В) неправильным выбором силлера при пломбировании корневых каналов
- Г) врожденным пороком билиарной системы

**833. [T002918] ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ НАЧАЛА ОБРАЗОВАНИЯ КИСЛОТЫ БАКТЕРИАЛЬНОЙ БЛЯШКОЙ ПОСЛЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛАДКОЙ ПИЩИ**

- А) несколько секунд
- Б) 2 мин
- В) 15 мин
- Г) 30 мин

**834. [T002919] ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ЗУБОВ**

- А) пищевые продукты и лекарственные средства для полоскания полости рта
- Б) гибель пульпы
- В) эндодонтическое лечение
- Г) кровоизлияния в пульпу

**835. [T002920] ПРИЧИНА ПОЛОМКИ БАЗИСА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА, СВЯЗАННАЯ С НЕБРЕЖНЫМ ОТНОШЕНИЕМ ПАЦИЕНТА К СВОЕМУ ПРОТЕЗУ**

- А) плохой уход, плохое хранение, откусывание твердой пищи
- Б) неправильный выбор зубной щетки для чистки протезов
- В) неправильный выбор зубной пасты для чистки протезов
- Г) на ночь снимал протезы и хранил их в дистиллированной воде

**836. [T002921] ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭМАЛИ ПОВЫШАЕТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ**

- А) углеводистой пищи
- Б) ультрафиолетового света
- В) глюконата кальция
- Г) фторидсодержащих зубных паст

**837. [T002922] ПОЯВЛЕНИЕ БОЛЕЙ В УВЕЛИЧЕННЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ ПОСЛЕ ПРИЕМА НЕБОЛЬШИХ ДОЗ АЛКОГОЛЯ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- А) лимфогранулематоза
- Б) метастазов плоскоклеточного рака
- В) метастазов меланомы
- Г) синдрома Шёгрена

**838. [T002923] ПРИЧИНОЙ ФЛЮОРОЗА ЗУБОВ В ЭНДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) повышенное содержание фторида в питьевой воде
- Б) пониженное содержание фторида в питьевой воде
- В) инфекционные заболевания ребенка на первом году жизни
- Г) недостаток поступления кальция в организм ребенка

**839. [T002924] ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ СМЫКАНИЯ ГУБ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗУБО-ЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ**

- А) миогимнастику для укрепления круговой мышцы рта
- Б) ношение элайнеров
- В) активатор функции Френкеля IV типа
- Г) аппарат Брюкля